

Гексикон (гель)



Код АТХ:

- [D08AC02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хлоргексидина биглюконат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для местного и наружного применения 0.5%** бесцветный, прозрачный.

	1 г
хлоргексидина биглюконат	5 мг

Вспомогательные вещества: полоксамер 407, кремофор RH-40 (полиоксил 40 гидрированное касторовое масло), вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Хлоргексидин - антисептический препарат для местного интравагинального применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, в т.ч. *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes simplex 2* типа. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы. Хлоргексидин не нарушает функциональную активность лактобактерий. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

Показания к применению:

- лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных);
- профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);
- профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес);

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Герпес](#)
- [Гонорея](#)
- [Диатез](#)
- [Инфекции](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Сифилис](#)
- [Трихомониаз](#)
- [Уреаплазма](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: детский возраст.

В детском возрасте рекомендуется применять Гексикон Д, суппозитории вагинальные 8 мг.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. Перед применением таблетку рекомендуется смочить в воде.

Для лечения: по 1 вагинальной таб. 1-2 раза/сут, в течение 7-10 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем: 1 вагинальная таб. не позднее 2 ч после незащищенного полового акта.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, зуд влагалища, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна. Случаи передозировки препарата неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно только после тщательной оценки ожидаемой пользы для матери и риска для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Гексикон (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Хлоргексидин не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Особые указания и меры предосторожности:

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость таблеток вагинальных Гексикон, т.к. препарат применяется интравагинально.

Возможно применение во время менструации, т.к. Гексикон таблетки сохраняют свою активность, хотя и несколько пониженную, в присутствии крови, гноя и других биологических жидкостей.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью*: детский возраст.

В детском возрасте рекомендуется применять Гексикон Д, суппозитории вагинальные 8 мг.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon_gel