Гексикон (гель)



Код АТХ:

- D08AC02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидина биглюконат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для местного и наружного применения 0.5%*** бесцветный, прозрачный.

	1 г
хлоргексидина биглюконат	5 мг

Вспомогательные вещества: полоксамер 407, кремофор RH-40 (полиоксил 40 гидрированное касторовое масло), вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Хлоргексидин - антисептический препарат для местного интравагинального применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, в т.ч. Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis, Herpes simplex 2 типа. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы. Хлоргексидин не нарушает функциональную активность лактобактерий. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

Показания к применению:

— лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных);

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

— профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес);

Относится к болезням:

- Вагинит
- Герпес
- Гонорея
- Диатез
- Инфекции
- Кольпит
- Кольпит
- Сифилис
- Трихомониаз
- Уреаплазма

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью:* детский возраст.

В детском возрасте рекомендуется применять Гексикон Д, суппозитории вагинальные 8 мг.

Способ применения и дозы:

Интравагинально. Перед применением таблетку рекомендуется смочить в воде.

Для *лечения*: по 1 вагинальной таб. 1-2 раза/сут, в течение 7-10 дней.

Для *профилактики инфекций, передаваемых половым путем*: 1 вагинальная таб. не позднее 2 ч после незащищенного полового акта.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, зуд влагалища, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна. Случаи передозировки препарата неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата возможно только после тщательной оценки ожидаемой пользы для матери и риска для плода и ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Хлоргексидин не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Особые указания и меры предосторожности:

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость таблеток вагинальных Гексикон, т.к. препарат применяется интравагинально.

Возможно применение во время менструации, т.к. Гексикон таблетки сохраняют свою активность, хотя и несколько пониженную, в присутствии крови, гноя и других биологических жидкостей.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью:* детский возраст.

В детском возрасте рекомендуется применять Гексикон Д, суппозитории вагинальные 8 мг.

Условия хранения:

Хранить препарат в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon_gel