Гексикон (свечи)



Код АТХ:

- D08AC02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидина биглюконат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суппозитории вагинальные*** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности.

	1 супп.
хлоргексидина биглюконат	16 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксидная основа (полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400).

1 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический препарат для местного применения.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Treponema pallidum, Chlamydia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis; *простейших:* Trichomonas vaginalis; *вирусов:* Herpes simplex типов 1 и 2.

Гексикон не нарушает функциональную активность лактобацилл.

Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

При интравагинальном практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания к применению:

— профилактика инфекций, передаваемых половым путем (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, генитального герпеса);

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

— лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Относится к болезням:

- Вагинит
- Герпес
- Гонорея
- Диатез
- Инфекции
- Кольпит
- Кольпит
- Трихомониаз
- Уреаплазма

Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Для *профилактики инфекций, передаваемых половым путем,* назначают однократно 1 суппозиторий. Препарат следует применять не позже 2 ч после полового акта.

Для *лечения* назначают по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Гексикон не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозиториев Гексикон, т.к. препарат применяется интравагинально.

Особые указания и меры предосторожности:

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

Применение в детском возрасте

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon_svechi