

## [Гексикон \(свечи\)](#)



### **Код АТХ:**

- [D08AC02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Хлоргексидина биглюконат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Суппозитории вагинальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности.

	<b>1 супп.</b>
хлоргексидина биглюконат	16 мг

*Вспомогательные вещества:* полиэтиленоксидная основа (полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400).

1 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антисептический препарат для местного применения.

## Гексикон (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*; простейших: *Trichomonas vaginalis*; вирусов: *Herpes simplex* типов 1 и 2.

Гексикон не нарушает функциональную активность лактобацилл.

Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

### Фармакокинетика

При интравагинальном практически не всасывается, системного действия не оказывает.

## Показания к применению:

— профилактика инфекций, передаваемых половым путем (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, генитального герпеса);

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

— лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

## Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Герпес](#)
- [Гонорея](#)
- [Диатез](#)
- [Инфекции](#)
- [Кольпит](#)
- [Кольпит](#)
- [Трихомониаз](#)
- [Уреаплазма](#)

## Противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем, назначают однократно 1 суппозиторий. Препарат следует применять не позже 2 ч после полового акта.

Для лечения назначают по 1 суппозиторию 2 раза/сут в течение 7-10 дней.

## Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Гексикон не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость вагинальных суппозитория Гексикон, т.к. препарат применяется интравагинально.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

### ***Применение в детском возрасте***

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Geksikon\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Geksikon_svechi)