

[Гексорал табс классик](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Амилметакрезол](#)
- [Дихлорбензиловый спирт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки для рассасывания (апельсиновые)** оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза - 1618 мг, декстроза - 830.4 мг, лимонной кислоты моногидрат - 21 мг, масло апельсина - 7.515 мг, масло семян аниса - 2.53 мг, масло листьев мяты полевой - 1.32 мг, краситель солнечный закат желтый - 300 мкг.

- 4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
- 4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (лимонные)** желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза -1618 мг, декстроза - 830.4 мг, лимонной кислоты моногидрат - 21 мг, масло семян аниса - 2.53 мг, масло листьев мяты полевой - 1.32 мг, концентрат масла лимона - 7.7 мг, краситель хинолиновый желтый - 175 мкг.

Гексорал табс классик

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (медово-лимонные)** от коричневатого-желтого до коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза - 1618 мг, декстроза - 830.4 мг, масло листьев мяты полевой - 1.25 мг, масло лимона - 1.25 мг, ароматизатор медовый - 7.5 мг, краситель карамель - 625 мкг, краситель солнечный закат желтый - 37.5 мкг.

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.

◇ **Таблетки для рассасывания (черносмородиновые)** фиолетового цвета, круглые, двояковыпуклые, с шероховатой поверхностью; допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха и незначительная неровность краев.

	1 таб.
2,4-дихлорбензиловый спирт	1.2 мг
амилметакрезол	600 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза - 1618 мг, декстроза - 830.4 мг, лимонной кислоты моногидрат - 15 мг, масло листьев мяты полевой - 1.25 мг, ароматизатор черносмородиновый - 6.25 мг, краситель азорубин - 62.5 мкг, краситель бриллиантовый голубой - 27.5 мкг.

4 шт. - стрипы алюминиевые (2) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (3) - пачки картонные.
4 шт. - стрипы алюминиевые (4) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (2) - пачки картонные.
8 шт. - блистеры Ал/ПВХ (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, обладает антимикотическим действием.

Показания к применению:

— лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 6 лет;
— повышенная чувствительность к компонентам.

Способ применения и дозы:

Взрослые и дети старше 6 лет: рассасывать по 1 таб. каждые 2-3 ч. Максимальная суточная доза - 8 таб.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Передозировка:

Случаев передозировки препарата при применении в рекомендуемых дозах не отмечено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

При назначении препарата пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать наличие сахара в составе препарата.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и обслуживать движущееся механическое оборудование.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 6 лет. Возможно применение у детей старше 6 лет по показаниям.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C в сухом, недоступном для детей месте. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksoral_tabs_klassik