Гельминтокс



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пирантел

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой желто-оранжевого цвета, продолговатые, с риской на одной стороне; на поперечном разрезе - ядро лимонно-желтого цвета.

	1 таб.
пирантела эмбонат	360.5 мг,
что соответствует содержанию пирантела	125 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный - 34 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 18.5 мг, магния стеарат - 7 мг.

Состав пленочной оболочки: Сепифилм 002 (гипромеллоза, метилгидроксипропилцеллюлоза, макрогола 400 моностеарат) - 12.5 мг, Сеписперс АР3065 желтый (пропиленгликоль, титана диоксид (Е171), краситель солнечный закат желтый (Е110)) - 7.5 мг, тальк - 100 мкг.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой желто-оранжевого цвета, продолговатые, с риской на одной стороне; на поперечном разрезе - ядро лимонно-желтого цвета.

	1 таб.
пирантела эмбонат	721 мг,
что соответствует содержанию пирантела	250 мг

Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный прежелатинизированный - 68 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 31.5 мг, магния стеарат - 14.5 мг.

Состав пленочной оболочки: Сепифилм 002 (гипромеллоза, метилгидроксипропилцеллюлоза, макрогола 400 моностеарат) - 28.2 мг, Сеписперс АР3065 желтый (пропиленгликоль, титана диоксид (Е171), краситель солнечный закат желтый (Е110)) - 16.8 мг, тальк - 200 мкг.

3 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Суспензия для приема внутрь светло-желтого цвета, гомогенная, с характерным запахом; возможно выпадение осадка; при взбалтывании частицы легко опять переходят в суспензию.

	100 мл
пирантела эмбонат	14.42 г,
что соответствует содержанию пирантела	5 г

Вспомогательные вещества: сорбитол кристаллизованный - 72.1 г, глицерол - 6.07 г, полисорбат 80 - 100 мг, лецитин соевый - 250 мг, поливидон - 60 мг, лимонная кислота - 30 мг, натрия бензоат - 236 мг, силиконовая эмульсия - 50 мг, ароматизатор черносмородиновый-карамельный - 600 мг, магния алюмосиликат - 330 мг, вода очищенная - до 100 мл.

15 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерной ложкой емкостью 2.5 мл - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогельминтный препарат. Вызывает нервно-мышечную блокаду чувствительных гельминтов и обеспечивает их изгнание из ЖКТ без возбуждения и стимуляции миграции пораженных гельминтов. В просвете кишечника эффективен против зрелых и незрелых чувствительных гельминтов обоего пола.

Высокоэффективен против инвазий, вызываемых острицами (Enterobius vermicularis), аскаридами (Ascaris lumbricoides), анкилостомами (Ankylostoma duodenale и Necator americanus).

Фармакокинетика

Всасывание

Практически не абсорбируется из ЖКТ. После приема разовой дозы 12.5 мг/кг массы тела концентрация пирантела в плазме крови в течение 1-3 ч составляет 0.05-0.13 мкг/мл.

Метаболизм и выведение

Частично метаболизируется в печени до К-метил-1,3-пропанедиамина.

Выводится через кишечник (около 93%) в неизмененном виде, почками (7%) - в неизмененном виде или в виде метаболита.

Показания к применению:

— аскаридоз;

— энтеробиоз;

— анкилостомидоз.

Относится к болезням:

- Аскаридоз
- Энтерит
- Энтеробиоз

Противопоказания:

— миастения;

— печеночная недостаточность;

— повышенная чувствительность к пирантелу и другим компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат **детям в возрасте до 6 мес.**

Способ применения и дозы:

Таблетки назначают **взрослым и детям в возрасте старше 6 лет**. **Детям в возрасте младше 6 лет и массой тела более 12 кг** рекомендуется назначать препарат в форме суспензии. Перед употреблением суспензию следует взбалтывать.

1 мл суспензии содержит 50 мг пирантела, 1 мерная ложка (2.5 мл) содержит 125 мг пирантела.

Гельминтокс можно принимать в любое время суток, без предварительного приема слабительных, необязательно натощак.

Препарат назначают однократно.

При *лечении энтеробиоза и аскаридоза* препарат назначают однократно из расчета 12.5 мг/кг массы тела.

Пациенты	Суспензия для приема внутрь	Таблетки 125 мг	Таблетки 250 мг
Дети младше 6 лет	1 мерная ложка/10 кг массы тела	-	-
Дети старше 6 лет	1 мерная ложка/10 кг массы тела	1 таб./10 кг массы тела	-
Взрослые с массой тела менее 75 кг	6 мерных ложек	6 таб.	3 таб.
Взрослые с массой тела более 75 кг	8 мерных ложек	8 таб.	4 таб.

Для *профилактики повторного заражения* рекомендуется повторить прием препарата через 3 недели.

В *зонах эндемии, в случае заражения Necator americanus или в случае тяжелого заражения Ankylostoma duodenale* доза составляет 25 мг/кг массы тела/сут (в 1-2 приема) в течение 2-3 дней.

Пациенты	Доза препарата
Дети	250 мг/10 кг массы тела ежедневно
Взрослые с массой тела менее 75 кг	1.5 г/сут
Взрослые с массой тела более 75 кг	2 г/сут

В *случае заражения Ankylostoma duodenale вне зон эндемии* (протекает более легко) препарат назначают в дозе 12.5 мг/кг однократно.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: иногда - тошнота, рвота, боли в животе, диарея, потеря аппетита (чаще всего эти симптомы обусловлены гибелью гельминтов), незначительное кратковременное повышение активности печеночных трансаминаз.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, ощущение усталости, сонливость или бессонница, нарушение слуха, галлюцинации, спутанность сознания, парестезии.

Аллергические реакции: зуд, крапивница, экзантема.

Прочие: гипертермия.

Передозировка:

При передозировке не отмечено симптомов выраженной интоксикации. Специфического антидота нет. Рекомендуется промыть желудок, при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности препарат следует применять только в случае крайней необходимости.

Пирантел выводится с грудным молоком. Поэтому не рекомендуется применять препарат Гельминтокс в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении пирантел повышает концентрацию теофиллина в плазме крови.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях печени.

Пациента следует информировать о том, что для того чтобы избежать повторного заражения необходимо строго соблюдать правила гигиены: мыть руки, подстригать и чистить ногти, не допускать расчесывания области промежности, ежедневно менять постельное и нижнее белье. Одновременно рекомендуется лечение всех членов семьи. Заражение часто может не проявляться никакими симптомами.

После завершения лечения необходимо провести контрольное исследование кала на наличие яиц гельминтов.

Не рекомендуется одновременное назначение левамизола, пиперазина.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью* следует назначать препарат **детям в возрасте до 6 мес.**

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gelmintoks