Гелусил Лак



Код АТХ:

- A02AD05

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Сималдрат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суспензия для приема внутрь***	**1 мл**	**1 пак.**
симальдрат* (магний-алюминий-силикат в форме гидрата)	172 мг	2.064 г

12 мл - пакетики бумажные ламинированные (20) - пачки картонные.
* *- непатентованное международное наименование, рекомендованное ВОЗ, в РФ принято написание международного наименования - сималдрат.*

Гелусил лак

◊ ***Таблетки*** желтовато-белого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с гладкой поверхностью, с фаской с обеих сторон, с запахом ванили.

	1 таб.
симальдрат (алюминия-магния силикат в форме гидрата)	500 мг

Вспомогательные вещества: молоко сухое, сахароза, магния стеарат, ароматизатор ванильный 39774, лактозы моногидрат, настойка ванили.

10 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат. Нейтрализует избыток соляной кислоты в желудке, оказывает обволакивающее и адсорбирующее действие. Предотвращает влияние агрессивных факторов на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, обладает антитоксическими свойствами. Не вызывает вторичной гиперсекреции и не

влияет на моторику ЖКТ.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

— острый гастрит с повышенной и нормальной секрецией;

— хронический гастрит с повышенной и нормальной секрецией в фазе обострения;

— острый дуоденит;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;

— грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;

— рефлюкс-эзофагит;

— дискомфорт или боли в эпигастрии, изжога, кислая отрыжка после избыточного употребления алкоголя, никотина, кофе, приема лекарственных средств, погрешностей в диете.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Дуоденит
- Изжога
- Отрыжка
- Рефлюкс-эзофагит
- Эзофагит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— выраженные нарушения функции почек;

— повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 таб. или по 1 пакетику суспензии 3-6 раз/сут.

Таблетки разжевывают или рассасывают через 1 ч после приема пищи.

Суспензию для приема внутрь принимают через 1-2 ч после приема пищи и перед сном.

При *необходимости эпизодического применения* (при дискомфорте после погрешностей в диете) принимают 1 таб. или 1 пакетик суспензии однократно.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - тошнота, рвота, запор, диарея, изменение вкусовых ощущений.

Со стороны мочевыделительной системы: при длительном применении в высоких дозах - гиперкальциурия, нефрокальциноз, почечная недостаточность.

Со стороны обмена веществ: при длительном применении в высоких дозах - гипермагниемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, гипералюминиемия.

Прочие: редко - аллергические реакции; при длительном применении в высоких дозах - остеомаляция, остеопороз, энцефалопатия.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Гелусил не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме Гелусил уменьшает абсорбцию тетрациклинов, пропранолола, изониазида, препаратов железа, индометацина, салицилатов.

Особые указания и меры предосторожности:

У пациентов с нарушениями функции почек при назначении Гелусила следует регулярно контролировать содержание магния в сыворотке крови и избегать длительного применения в высоких дозах.

При применении препарата вместе с соками из цитрусовых (особенно грейпфрутовым) повышается вероятность развития гипермагниемии.

Интервал между приемом Гелусила и других лекарственных средств должен составлять не менее 2 ч.

Использование в педиатрии

Не рекомендуется назначать препарат **детям в возрасте до 10 лет**.

При нарушениях функции почек

Препарат противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

У пациентов с нарушениями функции почек при назначении Гелусила следует регулярно контролировать содержание магния в сыворотке крови и избегать длительного применения в высоких дозах.

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток следует хранить в защищенном от света и влаги недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Препарат в форме суспензии для приема внутрь следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 3 года.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gelusil_Lak