

## Гемоктин



### **Код АТХ:**

- [B02BD02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фактор свертывания крови viii](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Гематотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Гемостатическое средство, применяемое при гемофилии А. Способствует переходу протромбина в тромбин и образованию фибринового сгустка.

#### **Фармакокинетика**

У пациентов с гемофилией А  $T_{1/2}$  составляет 12 ч.

Активность фактора свертывания VIII снижается на 15% в течение 12 ч.

При повышении температуры  $T_{1/2}$  фактора свертывания VIII может уменьшиться.

### **Показания к применению:**

Профилактика и лечение кровотечений при гемофилии А, приобретенной недостаточности фактора свертывания VIII.

### **Относится к болезням:**

- [Гемофилия](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к фактору свертывания VIII.

## **Способ применения и дозы:**

Режим дозирования устанавливают индивидуально при постоянном контроле фактора свертывания VIII. Вводят в/в. Доза зависит от величины необходимого повышения уровня активности фактора свертывания VIII (который, в свою очередь, определяется тяжестью кровотечения), а также от массы тела пациента.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* возможны озноб, крапивница, лихорадка; очень редко - анафилактические реакции.

*Со стороны пищеварительной системы:* возможны тошнота, рвота.

*Прочие:* возможна головная боль.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данные о безопасности применения фактора свертывания VIII при беременности и в период лактации отсутствуют.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Даназол повышает активность фактора свертывания VIII.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

У пациентов, получающих фактор свертывания VIII, возможно развитие антител к его белку. В таких случаях эффективность терапии обычно уменьшается и может потребоваться увеличение дозы фактора свертывания VIII.

При тяжелой гемофилии А возможно профилактическое применение.

При применении препаратов из плазмы или крови человека нельзя полностью исключить вероятность заражения инфекционными заболеваниями, несмотря на современные методы получения таких лекарственных средств.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gemoktin>