

## Гендевит



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

♦ <b>Драже</b>	<b>1 драже</b>
ретинол (вит. А)	3300 МЕ
α-токоферола ацетат (вит. Е)	5 мг
эргокальциферол (вит. D <sub>2</sub> )	250 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. С)	75 мг
тиамин (вит. В <sub>1</sub> )	1.5 мг
рибофлавин (вит. В <sub>2</sub> )	1.5 мг
кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> )	3 мг
пиридоксин (вит. В <sub>6</sub> )	2 мг
фолиевая кислота (вит. В <sub>9</sub> )	300 мкг
цианокобаламин (вит. В <sub>12</sub> )	10 мкг
никотинамид (вит. РР)	10 мг

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Фармакологическое действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для сочетания в препарате Гендевит витаминов группы В с витаминами А, Е, С и Р является синергизм их физиологического действия на организм, при этом важно не только наличие тех или иных витаминов, но и их количественное соотношение.

### Показания к применению:

Применяют при:

- гиповитаминозах;
- для улучшения обмена веществ и общего состояния женщин в период беременности и лактации;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

## **Противопоказания:**

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат принимают внутрь после еды. С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется взрослым по 1-2 драже в сутки.

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца, по рекомендации врача.

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами.

### ***При нарушениях функции печени***

*С осторожностью:* при тяжелых поражениях печени.

## **Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Gendevit>