

Гендевит



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Драже	1 драже
ретинол (вит. А)	3300 МЕ
α-токоферола ацетат (вит. Е)	5 мг
эргокальциферол (вит. D ₂)	250 МЕ
аскорбиновая кислота (вит. С)	75 мг
тиамин (вит. В ₁)	1.5 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	1.5 мг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	3 мг
пиридоксин (вит. В ₆)	2 мг
фолиевая кислота (вит. В ₉)	300 мкг
цианокобаламин (вит. В ₁₂)	10 мкг
никотинамид (вит. РР)	10 мг

50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие обусловлено свойствами витаминов, входящих в его состав. Основанием для сочетания в препарате Гендевит витаминов группы В с витаминами А, Е, С и Р является синергизм их физиологического действия на организм, при этом важно не только наличие тех или иных витаминов, но и их количественное соотношение.

Показания к применению:

Применяют при:

- гиповитаминозах;
- для улучшения обмена веществ и общего состояния женщин в период беременности и лактации;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: при тяжелых поражениях печени, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после еды. С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется взрослым по 1-2 драже в сутки.

Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца, по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Не принимать одновременно с другими витаминными препаратами.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: при тяжелых поражениях печени.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gendevit>