Гентос



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические*** в виде прозрачной, от светло-желтого до коричневато-оранжевого цвета жидкости со слабым специфическим запахом.

	100 мл
осина канадская (Populus) D1	7 мл
сабал пильчатая (Sabal) D6	10 мл
болиголов пятнистый (Conium) D6	10 мл
калия йодид (Kalium iodatum) D12	10 мл
железа пикрат (Ferrum picrinicum) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% (по массе) - 53 мл.

20 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, белого или белого с желтоватым оттенком цвета с возможными вкраплениями и мраморностью, без запаха.

	1 таб.
осина канадская (Populus) D1	25 мг
сабал пильчатая (Sabal) D6	37.2 мг
болиголов пятнистый (Conium) D6	37.2 мг
калия йодид (Kalium iodatum) D12	37.2 мг
железа пикрат (Ferrum picrinicum) D12	37.2 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает антипролиферативное действие, влияет на механический компонент дизурии при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, регулирует тонус гладкой мускулатуры детрузора и стенки мочевого пузыря, повышая его резервуарно-эвакуаторную функцию, и влияет на динамический компонент дизурии при гиперплазии предстательной железы. Улучшает уродинамику и урофлоуметрические параметры. Гентос оказывает противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию в тканях органов мочеполовой системы. Умеренно усиливает кавернозный кровоток, восстанавливает эректильную функцию при хроническом простатите.

Фармакокинетика

Действие препарата Гентос является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— при острых и хронических заболеваниях предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит) для ослабления симптомов указанных заболеваний;

— при заболеваниях мочевого пузыря (цистит, атония мочевого пузыря).

Относится к болезням:

- Гиперплазия предстательной железы
- Простатит
- Цистит

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *хроническом простатите* назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При воздействии провоцирующих факторов проводят двухнедельные профилактические курсы.

При *доброкачественной гиперплазии предстательной железы* назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза/сут в зависимости от выраженности дизурии.

При *остром цистите* **взрослым и подросткам** назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 1-2 недели.

При *хроническом цистите* назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут.

При *острых нарушениях мочеиспускания (частые позывы к мочеиспусканию, ночные позывы к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря)* **взрослым и подросткам** назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2 недели. При *хронических нарушениях* назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут в течение 3 мес. Затем при необходимости переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут.

В *начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов*, возможен прием препарата по 8-10 капель или 1 таб. каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Гентос при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Гентос с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях щитовидной железы.

Пациент должен быть информирован о том, что при заболеваниях предстательной железы следует проконсультироваться с врачом.

Поскольку препарат Гентос в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных).

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток подъязычных следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Препарат в форме капель гомеопатических следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gentos