# Гепа-Мерц




## Код АТХ:

- A05BA

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Орнитин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь*** в виде смеси гранул оранжевого и белого цвета.

| | **1 пак. (5 г)** |
|---|---|
| L-орнитина L-аспартат | 3 г |

*Вспомогательные вещества:* лимонная кислота безводная, ароматизатор лимонный, ароматизатор апельсиновый, натрия сахаринат (сахарин натрия), натрия цикламат, краситель солнечный закат желтый, поливинилпирролидон (повидон), фруктоза (левулеза).

5 г - пакетики (10) - коробки картонные.
5 г - пакетики (30) - коробки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Гипоаммониемический препарат. Снижает повышенный уровень аммиака в организме, в частности, при заболеваниях печени. Действие препарата связано с его участием в орнитиновом цикле мочевинообразования Кребса (образование мочевины из аммиака).

Способствует выработке инсулина и соматотропного гормона. Улучшает белковый обмен при заболеваниях, требующих парентерального питания.

***Фармакокинетика***

Орнитин аспартат диссоциирует на составляющие его компоненты - аминокислоты орнитин и аспартат, которые всасываются в тонкой кишке путем активного транспорта через кишечный эпителий. Выводится с мочой через цикл мочевинообразования.

## Показания к применению:

— острые и хронические заболевания печени, сопровождающиеся гипераммониемией;

— печеночная энцефалопатия (латентная или выраженная).

## Относится к болезням:

- Энцефалит

## Противопоказания:

— почечная недостаточность тяжелой степени (сывороточный креатинин > 3 мг/100 мл);

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при беременности.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1 пакетику гранул, растворенных в 200 мл жидкости, 2-3 раза/сут, после приема пищи.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* в отдельных случаях - тошнота, рвота.

*Прочие:* аллергические реакции.

## Передозировка:

*Симптомы:* усиление выраженности побочных эффектов.

*Лечение:* промывание желудка, прием активированного угля, проводят симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат следует с осторожностью применять при беременности.

Препарат противопоказан к применению в период грудного вскармливания.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гепа-Мерц не описано.

## Особые указания и меры предосторожности:

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

При печеночной энцефалопатии необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

***При нарушениях функции почек***

Препарат противопоказан при почечной недостаточности тяжелой степение (показатель креатинина 3 мг/100 мл).

***При нарушениях функции печени***

Препарат применяется по показаниям.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Gepa-Merc