Гепабене



Код АТХ:

- A05AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Дымянки лекарственной травы экстракт
- Расторопши пятнистой плодов экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые, размер №0, светло-коричневого цвета; содержимое капсул - порошок от оранжево-коричневого до светло-коричневого цвета, с более светлыми вкраплениями.

	1 капс.
сухой экстракт травы дымянки лекарственной	275.1 мг,
в т.ч. протопина	4.13 мг
сухой экстракт плодов расторопши пятнистой	83.1 мг,
в т.ч. силимарин	50 мг
с содержанием силибинина не менее	22 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 80.1 мг, крахмал кукурузный - 20.1 мг, тальк - 8.4 мг, макрогол 6000 - 4.5 мг, кополивидон - 4.5 мг, магния стеарат - 2.1 мг, кремния диоксид - 2.1 мг.

Состав оболочки капсулы: желатин - 79.94 мг, железа оксид желтый - 0.67 мг, железа оксид красный - 0.15 мг, железа оксид черный - 0.04 мг, титана диоксид - 1.29 мг, вода очищенная - 13.92 мг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, содержит экстракт дымянки лекарственной и экстракт расторопши пятнистой. Экстракт дымянки лекарственной, содержащий алкалоид фумарин, нормализует количество секретируемой желчи, снимает спазм желчного пузыря и желчных протоков, облегчая поступление желчи в кишечник.

Экстракт плодов расторопши содержит силимарин, который проявляет гепатопротекторное действие при острых и хронических интоксикациях, связывает свободные радикалы и токсические вещества в ткани печени, обладает антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью, стимулирует синтез белка, способствует восстановлению клеток печени.

Гепабене нормализует функцию печени при различных хронических патологических состояниях.

Фармакокинетика

После приема внутрь флавоноиды, входящие в состав силимарина, экскретируются преимущественно с желчью и подвергаются кишечно-печеночной рециркуляции.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии дискинезии желчевыводящих путей (в т.ч. после холецистэктомии);

— в составе комплексной терапии при хронических гепатитах;

— в составе комплексной терапии при хронических токсических поражениях печени.

Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

— острые воспалительные заболевания печени и желчевыводящих путей;

— детский и подростковый возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь во время еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым препарат назначают по 1 капсуле 3 раза/сут.

При ночном болевом синдроме рекомендуется дополнительно принимать еще 1 капсулу перед сном.

При необходимости суточную дозу препарата можно увеличить до 6 капсул (максимальная суточная доза) в 3-4 приема в течение дня.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Иногда: послабляющее действие, увеличение диуреза.

Передозировка:

До настоящего времени явления передозировки не описаны.

В случаях передозировки пациент должен срочно обратиться к лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До настоящего времени не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения препаратом пациенты должны принимать только назначенные лечащим врачом лекарственные средства, строго соблюдать предписанные режим и диету, воздерживаться от употребления алкоголя.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при острых воспалительных заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gepabene