Гепафор



Код АТХ:

- A05BA

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Бифидобактерии и лактобактерии, входящие в состав препарата, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, угнетают их жизнедеятельность, препятствуют их адгезии на слизистой оболочке кишечника, создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, обеспечивают ее физиологические функции, способствуют нормализации микробиоценоза ЖКТ и повышению неспецифической резистентности организма, обладают иммуномодулирующим действием. Сорбированные в виде микроколоний бифидобактерии имеют преимущества для размножения на слизистой оболочке кишечника. Лактобактерии совместно с бифидобактериями оказывают усиленное подавляющее действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку. Бактерии нормальной микрофлоры активизируют пристеночное пищеварение, участвуют в ферментативном расщеплении белков, жиров, углеводов, в процессах метаболизма желчных кислот и холестерина, что обеспечивает гипохолестеринемическое действие; способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D, синтезируют аминокислоты, витамины (особенно группы B).

Показания к применению:

— заболевания ЖКТ, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек;

— острые кишечные инфекции, вызванные ротавирусами, условнопатогенной микрофлорой, и в период реконвалесценции для восстановления нормофлоры кишечника;

— острые кишечные инфекции неустановленной этиологии;

— хронические заболевания ЖКТ, в т.ч. с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условнопатогенных микроорганизмов в высоких титрах.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Реконвалесценция

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

С *осторожностью:* лактазная недостаточность.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, во время приема или независимо от приема пищи.

Кратность приема и дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от возраста пациента.

Курс лечения при *острых кишечных инфекциях* - 5-7 дней, при *дисбактериозе кишечника* - 10-15 дней.

Побочное действие:

Не установлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Витамины (особенно группы В) - усиливают, а антибиотики снижают действие препарата.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gepafor