

Гепатосан



Код АТХ:

- [A05BA](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** твердые желатиновые, №0, с крышечкой и корпусом желтого цвета; содержимое капсул - порошок светло-коричневого цвета, со специфическим запахом.

| | |
|---|----------------|
| | 1 капс. |
| сублимационно высушенные клетки печени донорской свиньи | 200 мг |

Состав желатиновой капсулы: титана диоксид - 1.333%, краситель желтый хинолиновый - 0.9197%, краситель желтый закатный - 0.0044%), желатин - до 100%.

10 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.

20 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.

30 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат усиливает детоксикационную и белоксинтезирующую функции печени, улучшает метаболическую способность печеночных клеток, способствует сорбции и выведению токсинов. Механизм действия препарата имеет две фазы: кишечную, в которой происходит детоксикация за счет сорбции токсических продуктов в кишечнике, и метаболическую (гепатопротективную), в которой биологические компоненты препарата способствуют восстановлению функциональной активности печени. Препарат содержит аминокислоты, микроэлементы, витамины, эссенциальные фосфолипиды, мезенхимальные ферменты, цитохромы.

Показания к применению:

— цирроз печени различной этиологии,

Гепатосан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- хронические гепатопатии (гепатиты, гепатозы),
- острая и хроническая печеночная недостаточность,
- лекарственные и алкогольные поражения печени,
- отравления,
- нарушение процесса пищеварения (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Цирроз печени](#)

Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь за 15-20 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.

При *остром течении печеночной недостаточности* препарат принимают по 400 мг (2 капсулы) 2 раза в день. Курс лечения 10 дней.

При *хроническом течении печеночной недостаточности* принимают по 400 мг (2 капсулы) 2 раза в день. Курс лечения 20 дней.

В зависимости от клинического течения и тяжести заболевания курс лечения повторяют по рекомендации врача.

При *циррозе печени в стадии декомпенсации* принимают по 400 мг (2 капсулы) 3 раза в день, курс лечения 10 дней, затем по 200 мг (1 капсула) 2 раза в день. Курс лечения 14 дней. С целью *уменьшения интоксикации у больных с циррозом печени* принимают по 200-400 мг (1-2 капсулы) в день постоянно.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции печени

Применяется при нарушениях функции печени.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Гепатосан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gepatosan>