Гепатромбин



Код АТХ:

- C05BA53

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аллантоин
- Гепарин натрия
- Декспантенол]

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом.

	100 г
гепарин натрия	30 000 МЕ
аллантоин	250 мг
декспантенол	250 мг

Вспомогательные вещества: карбомер - 933 мг, левоментол - 20 мг, динатрия эдетат - 100 мг, троламин - 550 мг, масло хвои горной сосны - 80 мг, масло хвои сосны обыкновенной - 80 мг, масло лимона - 20 мг, сорбитол - 2 г, изопропанол - 25.37 г, софтиген 767 (макрогола-6-глицерилкаприлокапрат) - 200 мг, полисорбат - 500 мг, вода очищенная - 68.485 мл.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◊ ***Гель для наружного применения*** бесцветный, прозрачный, с характерным запахом.

	100 г
гепарин натрия	50 000 МЕ
аллантоин	250 мг
декспантенол	250 мг

Вспомогательные вещества: карбомер 940 - 1.1 г, левоментол - 20 мг, динатрия эдетат - 100 мг, триэтаноламин - 590 мг, масло сосны обыкновенной (Pini silvestris) - 80 мг, масло кедрового стланика (Pini pumilionis) - 80 мг, эфирное масло лимона - 20 мг, сорбитол 70% (некристаллизующийся) - 2 г, изопропанол - 25.37 г, софтиген 767 - 200 мг, полисорбат 80 - 1 г, вода очищенная - 68.86 мл.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◊ ***Мазь для наружного применения*** белого цвета, однородная, с характерным запахом.

	100 г
гепарин натрия	30 000 МЕ
аллантоин	300 мг
декспантенол	400 мг

Вспомогательные вещества: бронопол - 100 мг, карбомер - 660 мг, воск микрокристаллический - 6 г,

трисалкилмакрогола фосфат - 3 г, левоментол - 150 мг, парафин жидкий - 6 г, пурцелинол - 3 г, глицериды жирных кислот - 6.15 г, динатрия эдетат - 100 мг, троламин - 220 мг, вазелин - 5 г, вода очищенная - 68.4 мл.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

◊ ***Мазь для наружного применения*** белого цвета, однородная, с характерным запахом.

	100 г
гепарин натрия	50 000 МЕ
аллантоин	300 мг
декспантенол	400 мг

Вспомогательные вещества: бронопол, карбомер 934, лунацера М, хостафат, KW-340-N, левоментол, парафин жидкий, пурцелинол, теги 515, динатрия эдетат, триэтаноламин, вазелин белый, вода очищенная.

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства
- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с антитромботическим, противовоспалительным и улучшающим регенерацию тканей действием для наружного применения.

Гепарин - антикоагулянт прямого действия. При местном применении гепарин препятствует образованию тромбов, обладает противоотечным и противовоспалительным действием, улучшает местный кровоток.

Аллантоин оказывает противовоспалительное действие, стимулирует процессы обмена веществ в тканях и способствует пролиферации клеток.

Декспантенол улучшает всасывание гепарина, стимулирует грануляцию и эпителизацию тканей.

Фармакокинетика

После местного нанесения на кожу гепарин относительно быстро проникает через эпидермис и накапливается в верхних слоях кожи. Активно связывается с протеинами кожи. Из тканей выделяется медленно с периодом выделения около 1 ч. Фармакологическое действие оказывает в концентрации от 10 МЕ/мл в эпидермисе и 0.6 МЕ/мл соответственно в коже.

Показания к применению:

— тромбоз;

— тромбофлебит;

— варикозное расширение вен;

— трофические язвы голени (для мази);

— спортивные травмы;

— тендовагинит;

— воспалительные инфильтраты.

Относится к болезням:

- Варикоз
- Инфильтраты
- Тендовагинит
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит

- Трофические язвы

Противопоказания:

— инфицированные поражения кожных покровов;

— нарушение целостности кожных покровов (для геля);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Столбик **мази** длиной 5 см наносят на пораженные участки 1-3 раза/сут.

При *заболеваниях вен* препарат применяют в виде повязок с мазью.

При *трофических язвах* мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см.

При *заболеваниях вен нижних конечностей* мазь наносят легкими массирующими движениями по направлению снизу вверх, разовую дозу рекомендуется втирать не полностью, а отдельными порциями.

Гель наносят на кожу тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх. В случае применения геля при *тромбозах и тромбофлебитах* массирование не рекомендуется.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Гепатромбин не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) Гепатромбина с содержанием гепарина натрия 300 ЕД/1 г возможно в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Данные о возможности применения Гепатромбина с содержанием гепарина натрия 500 ЕД/1 г при беременности и в период лактации не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Гепатромбин не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Входящие в состав прочих ингредиентов геля эфирные масла оказывают противомикробное и анальгезирующее действие.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gepatrombin