Гепатромбин Г (свечи)



Код АТХ:

- C05BA53

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гепарин натрия
- Лауромакрогол 600
- Преднизолон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Мазь для ректального и наружного применения*** желтовато-белого цвета, полупрозрачная, гелеобразная.

	1 г
гепарин натрия	65 МЕ*
преднизолона ацетат	2.233 мг
лауромакрогол 600	30 мг

Вспомогательные вещества: парафин твердый - 50 мг, парафин жидкий - 797.11 мг, ланолин - 50 мг, кремния диоксид коллоидный - 70 мг.

20 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с наконечником для ректального введения - пачки картонные.

* 1 МЕ гепарина натрия - антикоагулянтная активность, соответствует активности 7.7 мкг II Международного стандарта гепарина (ВОЗ).

◊ ***Суппозитории ректальные*** белого цвета, конические; на срезе - белого цвета, гомогенные.

	1 супп.
гепарин натрия	120 МЕ*
преднизолона ацетат	1.675 мг
лауромакрогол 600	30 мг

Вспомогательные вещества: триглицериды среднецепочные - 1.08 мг, кремния диоксид коллоидный - 11.4 мг, жир

твердый (Novata B) - 1801.2 мг, глицерил тристеарат - 27.5 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные из ПВХ (2) - пачки картонные.

* 1 МЕ гепарина натрия - антикоагулянтная активность, соответствует активности 7.7 мкг II Международного стандарта гепарина (ВОЗ).

Фармакотерапевтическая группа:

- Гематотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат с антитромботическим, противовоспалительным и веносклерозирущим действием для местного применения в проктологии.

Гепарин - антикоагулянт прямого действия. При наружном применении оказывает местное антитромботическое, противоэкссудативное и умеренное противовоспалительное действие; способствует регенерации соединительной ткани; предотвращает коагуляцию крови в геморроидальных узлах.

Преднизолон - ГКС, оказывает противовоспалительное, противоэкссудативное и противоаллергическое действие, уменьшает зуд, чувство жжения, боль в аноректальной области.

Лауромакрогол 400 (полидоканол) оказывает местноанестезирующее действие и обеспечивает склерозирование геморроидальных узлов.

Фармакокинетика

Гепарин

Всасывание и метаболизм

После абсорбции биотрансформируется в печени (частично ферментом печеночная гепариназа) и в ретикулоэндотелиальной системе.

Распределение и выведение

Связывание с белками плазмы составляет 95%.

V_d возрастает с увеличением дозы. Выводится почками. $T_{1/2}$ - 60-90 мин.

Преднизолон

Всасывание и метаболизм

Преднизолон после абсорбции биотрансформируется в печени.

Выведение

Около 1% выводится с мочой в неизмененном виде. Биологический $T_{1/2}$ составляет 18-36 ч, а $T_{1/2}$ из плазмы - 115-212 мин.

Показания к применению:

— наружный и внутренний геморрой;

— тромбофлебит вен заднего прохода;

— свищи, экзема и зуд в области ануса;

— трещины ануса.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Зуд
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Экзема

Противопоказания:

— бактериальные, вирусные, грибковые поражения кожи;

— туберкулез;

— сифилис;

— опухоли кожи;

— реакции на вакцинацию;

— предрасположенность к кровотечениям;

— I триместр беременности;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно на пораженные участки мазь наносят тонким слоем 2-4 раза/сут; после исчезновения болезненных ощущений – 1 раз/сут в течение 7 дней.

Ректально суппозитории вводят 1-2 раза/сут после дефекации.

Для введения мази в прямую кишку используется навинчивающийся на тюбик наконечник, который вводят в прямую кишку и легким нажатием на тюбик выдавливают небольшое количество мази.

Побочное действие:

Местные реакции: аллергические реакции, гиперемия кожи.

При длительном применении и/или при нанесении на большие поверхности возможны системные побочные эффекты.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Гепатромбин Г не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Гепатромбин Г не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

При нанесении большого количества препарата на поврежденную кожу или слизистые оболочки отмечается замедление процессов регенерации.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре от 15° до 25°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gepatrombin_G_svechi