

## [Гепазолон \(свечи\)](#)



### **Код АТХ:**

- [C05AX03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Гепарин натрия](#)
- [Лидокаин](#)
- [Преднизолон](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| ↪ <b>Суппозитории ректальные</b> | <b>1 супп.</b> |
| гепарин натрий                   | 120 МЕ         |
| преднизолон                      | 1.7 мг         |
| лидокаина гидрохлорид            | 20 мг          |

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Регенеранты и репаратанты](#)

### **Показания к применению:**

- наружный и внутренний геморрой, в т.ч. острый;
- тромбоз флебит геморроидальных вен перианальной области;
- свищи;
- экзема;
- зуд в области ануса, вызванный воспалением;
- анальные трещины;
- подготовка к оперативному вмешательству в аноректальной зоне;

— в составе комплексной терапии тромбированного и оперированного геморроя.

### Относится к болезням:

- [Анальные трещины](#)
- [Воспаление](#)
- [Геморрой](#)
- [Зуд](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Экзема](#)

### Противопоказания:

— вирусные, грибковые, туберкулезные и другие инфекционные процессы аноректальной области, нарушения коагуляционной системы с предрасположенностью к кровотечениям;

— беременность и период лактации;

— детский возраст до 12 лет;

— гиперчувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

При внутреннем геморрое суппозиторий вводить в полость прямой кишки 1-2 раза в сутки. При наружном геморрое суппозиторий вводить в задний проход не полностью - его основание должно прощупываться снаружи.

Придерживайте анус марлевой салфеткой до полного таяния суппозитория (2-3 мин), иначе суппозиторий «провалится» в прямую кишку, не оказав лечебного действия.

Курс лечения - 7 дней. По рекомендации врача курс может быть продлен до 14 дней.

### Побочное действие:

Препарат обычно хорошо переносится. При рекомендуемой дозе препарата побочных эффектов не выявлено.

При применении препарата более 5 недель возможны системные побочные эффекты, связанные с действием преднизолона:

*Со стороны эндокринной системы:* снижение толерантности к глюкозе, "стероидный" сахарный диабет, угнетение функции надпочечников, синдром Иценко-Кушинга. Со стороны сердечно-сосудистой системы возможны аритмии, брадикардия (у предрасположенных пациентов), ЭКГ-изменения, характерные для гипокалиемии, повышение артериального давления.

*Со стороны нервной системы:* бессонница, головокружение.

*Со стороны обмена веществ:* повышенное выведение ионов кальция, гипокальциемия, повышенное потоотделение.

Возможны аллергические реакции вызванные лидокаином и гепарином в виде зуда и раздражения ануса.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

### Условия хранения:

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности:

## **Гепазолон (свечи)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gepazonon\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Gepazonon_svechi)