Гепон



Код АТХ:

- L03AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь и наружного применения	**1 фл.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	1 мг

Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь и наружного применения	**1 фл.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	2 мг

Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.
Флаконы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь и наружного применения	**1 амп.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	1 мг

Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь и наружного применения	**1 амп.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	2 мг

Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - фл.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.
Ампулы (1) - упаковки ячейковые контурные (1) в комплекте с растворителем (вода д/и 5 мл - амп.) и одноразовым шприцем - пачки картонные.

Раствор для приема внутрь и наружного применения 0.02%	**1 мл**	**1 фл.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	200 мкг	2 мг

10 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей или с насадкой-распылителем или с пипеткой или со шприцем - пачки картонные.

Раствор для приема внутрь и наружного применения 0.02%	**1 мл**	**1 фл.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	200 мкг	1 мг

5 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей или с насадкой-распылителем или с пипеткой или со шприцем - пачки картонные.

Раствор для приема внутрь и наружного применения 0.1%	**1 мл**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	1 мг

1 мл - флаконы (1) в комплекте с пипеткой или со шприцем - пачки картонные.

Раствор для приема внутрь и наружного применения 0.1%	**1 мл**	**1 фл.**
синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков	1 мг	2 мг

2 мл - флаконы (1) в комплекте с пипеткой или со шприцем - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуномодулирующий препарат. Оказывает противовирусное действие. Препарат вызывает индукцию α- и β-интерферонов, мобилизует и активирует макрофаги, ограничивает выработку цитокинов воспаления (интерлейкины 1, 6, 8 и фактор некроза опухоли), стимулирует продукцию антител к различным антигенам инфекционной природы, подавляет репликацию вирусов, повышает резистентность организма в отношении инфекций, вызванных вирусами, бактериями или грибами.

У пациентов, инфицированых ВИЧ, Гепон снижает концентрацию ВИЧ в клетках крови и в плазме, одновременно активирует иммунные реакции, специфичные в отношении ВИЧ. У большинства пациентов, инфицированных ВИЧ, при применении Гепона отмечается увеличение содержания $CD4^+$ Т- и NK-клеток, повышается функциональная активность нейтрофилов и $CD8^+$ Т-клеток, являющихся ключевыми звеньями защиты организма от бактерий, вирусов и грибов, усиливается выработка антител, специфичных к антигенам ВИЧ, а также к антигенам возбудителей оппортунистических инфекций.

При курсовом применении Гепон предупреждает рецидивы оппортунистических инфекций в течение 3-6 мес.

При местном применении Гепона коротким курсом препарат эффективен при лечении рецидивирующих инфекций слизистых оболочек и кожи, вызванных грибами рода Candida.

Гепон оказывает противовоспалительное действие. В течение 1-2 дней после применения препарата существенно

уменьшаются признаки воспаления (в частности, покраснение и отечность, а также ощущение болезненности, жжения, зуда в области воспаленных слизистых оболочек и кожи). Применение Гепона устраняет сухость слизистых оболочек.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Гепон не изучалась в связи с его пептидной природой.

Показания к применению:

—коррекция ослабленного иммунитета при иммунодефицитных состояниях;

—лечение ВИЧ-инфекции;

—повышение иммунной защиты от инфекций;

—лечение и профилактика оппортунистических инфекций, вызванных бактериями, вирусами или грибами;

—лечение и профилактика кандидоза кожи и слизистых оболочек (в т.ч. вследствие антибиотикотерапии);

—уменьшение воспаления (покраснение, отек, зуд, жжение, боль) слизистых оболочек и кожи, а также сухости слизистых оболочек.

Относится к болезням:

- Воспаление
- Зуд
- Инфекции

Противопоказания:

—повышенная чувствительность к препарату;

—детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают **взрослым и детям старше 12 лет** в дозе 10 мг внутрь 1 раз/сут, или 1-2 мг в виде 0.02-0.04% раствора для местной обработки слизистых оболочек и кожи 1 раз/сут.

Для *лечения оппортунистических инфекций при ВИЧ-инфекции или при других иммунодефицитных состояниях* Гепон назначают ежедневно по 10 мг внутрь в течение 1-3 мес.

Для *лечения и профилактики инфекций слизистых оболочек и кожи, вызванных грибами рода Candida,* рекомендуется местное применение Гепона (0.02-0.04% раствор) в виде орошения пораженных участков слизистых оболочек и кожи. Курс лечения - 3 орошения с интервалом 1-3 дня между процедурами.

При *кандидозном вульвовагините, уретрите, цервиците* у **женщин** применяют орошения 0.02-0.04% раствором Гепона слизистой оболочки вульвы, влагалища, шейки матки, а также примочки на пораженные участки кожи, прилегающие ко входу во влагалище.

При *кандидозном уретрите, баланопостите* у **мужчин** применяют инстилляции 0.02-0.04% раствора Гепона в уретру и примочки на пораженные участки кожи.

Для профилактики *кандидоза слизистых оболочек и кожи* как возможного осложнения при интенсивной антибиотикотерапии требуется проводить орошения или примочки 0.02-0.04% раствором Гепона во время курса лечения антибиотиком.

Для *снижения интенсивности воспаления* слизистые оболочки следует орошать 0.02-0.04% раствором Гепона, а на воспаленные участки кожи прикладывать марлевые салфетки, смоченные 0.02-0.04% раствором Гепона.

Правила приготовления раствора

Перед применением порошок следует растворить в 5 мл воды для инъекций или физиологическом растворе.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не установлено.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гепон не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности не рекомендуется за исключением случаев, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Не рекомендуется применять Гепон в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гепон не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Результаты проведенных клинических исследований показывают, что активация местного иммунитета положительно влияет на течение эрозивно-язвенного поражения гастро-дуоденальной зоны у больных пожилого возраста. Гепон может быть рекомендован как в виде монотерапии, так и в комбинации с амоксициллином, трихополом и омепразолом.

Активация местного иммунитета слизистой оболочки кишечника эффективна для лечения дисбактериоза кишечника и синдрома раздраженного кишечника, при этом Гепон может быть рекомендован в виде монотерапии (микроклизмы).

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 6 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 8°С.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gepon