Гептронг



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Мед

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для в/м введения	**1 мл**	**1 амп.**
мед	4 мг	12 мг

3 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные пластиковые (2) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гептронг оказывает антиоксидантное действие, способствует стабилизации и уменьшению проницаемости мембран гепатоцитов, уменьшает активность в сыворотке крови маркеров повреждения гепатоцитов - ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, усиливает антитоксическую функцию печени, улучшает ее белоксинтезирующую и липидобразовательную функции. Уменьшает воспалительные изменения в печени, что ведет к снижению в ней активности деструктивного процесса, уменьшает интенсивность и ускоряет исчезновение клинических проявлений гепатита (диспепсического, холестатического и астеновегетативного синдромов, гепатомегалии).

Препарат как правило хорошо переносится, не вызывая болевых ощущений в месте инъекции. Препарат полностью включается в метаболический цикл, финальный продукт метаболизма - углекислый газ и вода.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии алкогольной болезни печени на любой стадии;

— в составе комплексной терапии неалкогольного стеатогепатита (в составе комплексной терапии);

— в составе комплексной терапии лекарственных поражений печени;

— в составе комплексной терапии токсических поражений печени;

— в составе комплексной терапии циррозов печени в стадии компенсации и субкомпенсации (в составе комплексной терапии);

— в составе комплексной терапии токсикозов беременных.

Относится к болезням:

- Алкогольная болезнь печени
- Лекарственное поражение печени
- Токсикоз

Противопоказания:

— любые формы повышенной чувствительности и непереносимости меда и продуктов, его содержащих;

— повышенная чувствительность к укусам пчел, ос и других перепончатокрылых насекомых.

Способ применения и дозы:

Препарат вводится внутримышечно, глубоко, в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы по 6 мл согласно следующим схемам:

При *алкогольной болезни печени* - 1 раз в день по схеме - 1, 2, 3 день по 3 мл; 4, 5 день по 6 мл; 6, 7 день по 9 мл; 8,9 день по 6 мл; 10, 11,12 день по 3 мл.

При *неалкогольном стеатогепатите* - 1 раз в день по схеме - 1,2,3 день по 3 мл; 4, 5 день по 6 мл; 6, 7 день по 9 мл; 8, 9 день по 6 мл; 10, 11, 12 день по 3 мл - 3-4 курса в течение полугода.

При *лекарственных и токсических поражениях печени* - в/м 6 мл первые 6 дней, затем по 3 мл в/м ежедневно в зависимости от клинического состояния пациента;

При *циррозах печени* - по 6 мл 1 раз в сутки. Курс 10-15 дней;

При *токсикозах беременных* - в/м 6 мл первые 6 дней, затем по 3 мл в/м ежедневно в зависимости от клинического состояния пациента.

Побочное действие:

В отдельных случаях наблюдается бессонница, повышение аппетита.

Передозировка:

Случаев передозировки до настоящего времени не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается индивидуально и в зависимости от клинической ситуации.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять при сахарном диабете (под контролем содержания глюкозы в крови). Содержание углеводов в 1 ампуле препарата соответствует 0,001 хлебной единицы.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geptrong