Гербион Сироп Плюща



Код АТХ:

- R05CA12

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Плюща листьев экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Сироп. По 150 мл сиропа во флаконе темного стекла (тип III), закупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Каждый флакон помещают в пачку картонную вместе с дозирующей пластиковой ложкой.

Состав:

Сироп	1 мл
активные компоненты:	
плюща листьев экстракт сухой (5–7,5:1)*	7 мг
вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (Е420) — 500 мг; глицерол (Е422) — 200 мг; натрия бензоат (Е211) — 2 мг; лимонной кислоты моногидрат (Е330) — 0,3 мг; бальзам ароматический** — 1 мг; вода очищенная — до 1 мл	
* Плюща листьев экстракт сухой (5–7,5:1) приготовлен из плюща листьев (*Hedera helix L.*, семейства Аралиевые *(Araliaceae), folium*) и этанола 30% (экстрагент)	
** Бальзам ароматический содержит пропиленгликоль (Е1520), этанол (Е1510), цитронеллы масло, цитраль из *Litsea cubeba*, лимона масло, кориандра масло	

Описание:

Сироп желтовато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — отхаркивающее, муколитическое.

Фармакодинамика

Растительный препарат от кашля; оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

Показания к применению:

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся упорным сухим кашлем; гепатохолециститы, пиелонефриты, нефролитиаз, подагра; дерматиты, гнойные раны, ожоги.

Относится к болезням:

- Гепатит
- Гепатоз
- Дерматит
- Инфекции
- Нефрит
- Нефролитиаз
- Ожоги
- Пиелит
- Пиелонефрит
- Подагра
- Раны

Противопоказания:

Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения функций щитовидной железы, повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Применяют в виде приготовленного настоя листьев внутрь - по 15-50 мл 2-3 раза/сут; наружно или местно для полосканий, промываний, примочек. Курс лечения 2-6 недель.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах не выявлены.

Передозировка:

Симптомы: при приеме больших доз (в 3 раза превышающих рекомендованные суточные дозы) может развиться тошнота, рвота и диарея.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет сообщений о лекарственном взаимодействии препарата Гербион® сироп плюща с другими ЛС. Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми ЛС, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Растение ядовито. При передозировке возникают тошнота, рвота, диарея, головная боль, может повышаться АД. При контакте с сырьем возможен дерматит.

Не рекомендуется применять в детском возрасте.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_Sirop_Plyushcha