

Гербион сироп подорожника



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аскорбиновая кислота](#)
- [Мальвы цветков экстракт](#)
- [Подорожника ланцетовидного листьев экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Сироп** от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом; допускается незначительная опалесценция.

	5 мл
жидкий экстракт листьев подорожника ланцетовидного (1:5)*	1.25 г
жидкий экстракт цветков мальвы (1:5)**	1.25 г
аскорбиновая кислота	65 мг

* - приготовлен из листьев подорожника ланцетовидного (*Plantaginis lanceolatae*, семейство подорожниковые - Plantaginaceae), воды очищенной (экстрагент), в соотношении 1:5 (из 1 части растительного сырья получают 5 частей экстракта).

** - приготовлен из цветков мальвы (*Malvae sylvestris*, семейство мальвовые - Malvaceae), воды очищенной (экстрагент), в соотношении 1:5 (из 1 части растительного сырья получают 5 частей экстракта).

Вспомогательные вещества: сахароза, метилпарагидроксибензоат (E218), апельсина масло.

150 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной ложкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, противомикробное (бактериостатическое) действие.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гербион сироп подорожника не предоставлены.

Показания к применению:

— в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних отделов дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем;

— при сухом кашле курильщика.

Противопоказания:

— сахарный диабет;

— врожденная непереносимость фруктозы;

— синдром нарушенного всасывания глюкозы/галактозы;

— врожденная недостаточность сахаразы/изомальтазы;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 14 лет препарат назначают по 2 мерные ложки (10 мл) 3-5 раз/сут; **детям в возрасте от 7 до 14 лет** - по 1-2 мерные ложки (5-10 мл) 3 раза/сут; **детям в возрасте от 2 до 7 лет** - по 1 мерной ложки (5 мл) 3 раза/сут.

Продолжительность лечения - 2-3 недели. Увеличение длительности или проведение повторного курса лечения возможно после консультации врача.

Препарат следует принимать внутрь, запивая достаточным количеством чая или теплой воды.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

В случае развития побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гербион сироп подорожника не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным и кормящим женщинам применять препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у данной категории пациентов).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Гербион сироп подорожника не следует назначать одновременно с противокашлевыми препаратами и

лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 4 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по режиму дозирования пациент получает на прием от 4 г (1 мерная ложка, что соответствует 0.4 XE) до 8 г (2 мерные ложки, что соответствует 0.8 XE) сахарозы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 2 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Не хранить в холодильнике.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_Sirop_Podorozhnika