

[Гербион Уртика](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капсулы** зеленого цвета; содержимое капсул - порошок светло-коричневого цвета с видимыми частицами более темного цвета.

	1 капс.
сухой экстракт корня крапивы (5:1)	300 мг
β-ситостерол	10 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный.

Состав оболочки: титана диоксид, красители (E110, E104, E124, E131), метилгидроксibenзоат, пропилгидроксibenзоат, желатин.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, применяемый при функциональных нарушениях мочеиспускания, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Влияя на метаболические процессы, снижает пролиферацию клеток предстательной железы, тормозит прогрессирование увеличения предстательной железы. Увеличивает объем выделяемой мочи и снижает остаточный объем мочи.

Оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению:

— нарушения мочеиспускания (никтурия, поллакиурия, затруднения при мочеиспускании, задержка мочи), обусловленные доброкачественной гиперплазией (аденомой) предстательной железы I и II стадии;

— восстановительный период после хирургического вмешательства по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы;

— хронический простатит неинфекционного генеза.

Относится к болезням:

- [Гиперплазия предстательной железы](#)
- [Простатит](#)

Противопоказания:

- лактазная недостаточность;
- галактоземия;
- синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1 капсуле 3 раза/сут. Через 2 недели терапии или после наступления клинического улучшения дозу следует несколько уменьшить - по 1 капсуле 2 раза/сут.

Продолжительность курса лечения - 6-8 недель. При необходимости курс лечения можно повторить через 6 мес.

Капсулы следует принимать после еды, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

Возможно: диспепсия, аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Гербион Уртика не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гербион Уртика не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед назначением препарата Гербион Уртика следует убедиться, что заболевание носит доброкачественный характер.

При назначении препарата следует учитывать, что 1 капсула препарата Гербион Уртика содержит 130 мг лактозы.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света и влаги, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_Urtika