Гербион сироп первоцвета



Код АТХ:

- R05CA10

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Первоцвета корней экстракт
- Тимьяна обыкновенного травы экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сироп*** коричневого цвета, со специфическим запахом; допускается наличие опалесценции.

	5 мл
жидкий экстракт корней первоцвета весеннего (1:2-4.6)*	1.03 г
жидкий экстракт травы тимьяна обыкновенного (1:3.3)**	2.06 г

* приготовлен из корней первоцвета (Primula veris L., f. Primulaceae), воды очищенной (экстрагент), в соотношении 1:2-4.6 (в среднем из 1 части растительного сырья получают 3.3 части экстракта).
** приготовлен из травы тимьяна (Thymus vulganis L., f. Lamiaceae), воды очищенной (экстрагент), в соотношении 1:3.3 (из 1 части растительного сырья получают 3.3 части экстракта).

Вспомогательные вещества: левоментол - 0.06 мг, метилпарагидроксибензоат (Е218) - 8.75 мг, сахароза - 3.16 мг.

150 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с дозировочной ложкой - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, противомикробное

действие, способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему отхождению мокроты.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гербион сироп первоцвета не предоставлены.

Показания к применению:

В качестве отхаркивающего препарата в комплексной терапии:

— воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудно отделяемой мокротой (в т.ч. бронхит, трахеит, трахеобронхит);

— при острых респираторных заболеваниях, сопровождающихся сухим кашлем.

Относится к болезням:

- Бронхит
- Острые респираторные заболевания
- Трахеит
- Трахеобронхит

Противопоказания:

— дети после перенесенного острого обструктивного ларингита (круп);

— бронхиальная астма;

— сахарный диабет;

— наследственная непереносимость фруктозы;

— синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы и врожденная недостаточность сахаразы/изомальтазы;

— детский возраст до 2 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к препаратам, содержащим активные вещества растений семейства первоцветные и семейства яснотковые.

Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь, запивая достаточным количеством теплой воды. Перед употреблением содержимое флакона следует взбалтывать.

Взрослым препарат назначают по 3 мерные ложки (15 мл) 3-4 раза/сут после еды.

Детям старше 14 лет назначают по 2 мерные ложки (10 мл) 3-4 раза/сут; **детям в возрасте от 5 до 14 лет** - по 1 мерной ложке (5 мл) 3 раза/сут; **детям в возрасте от 2 до 5 лет** - по 1/2 мерной ложки (2.5 мл) 3 раза/сут.

Продолжительность лечения - 2-3 недели. Увеличение длительности или проведение повторного курса лечения возможно после консультации врача.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Редко: тошнота, рвота, диарея.

В случае появления побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гербион сироп первоцвета не сообщалось.

В случае передозировки сапонинсодержащих препаратов возможны расстройства со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, диарея).

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременным и кормящим женщинам применять препарат не рекомендуется (в связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата у данной категории пациентов).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Гербион сироп первоцвета не следует назначать одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

В 1 мерной ложке сиропа (5 мл) содержится 3.16 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по режиму дозирования пациент получает на прием от 3.16 г (1 мерная ложка - 5 мл, соответствует 0.316 ХЕ) до 9.48 г (3 мерных ложки - 15 мл, соответствует 0.948 ХЕ) сахарозы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и работе с другими сложными техническими устройствами, требующей повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям после перенесенного острого обструктивного ларингита (круп) и в возрасте до 2 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Не хранить в холодильнике.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_sirop_pervocveta