Гербион женьшень



Код АТХ:

- A13A

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Женьшень

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** желатиновые; тело капсулы - желтого цвета, крышечка капсулы - черного цвета; содержимое - гигроскопичный порошок желтовато-коричневого цвета с видимыми вкраплениями белого цвета.

	1 капс.
экстракт корня женьшеня	350 мг
что соответствует содержанию гинзенозидов	21 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, тальк, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Состав оболочки капсулы: желатин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216, бриллиантовый черный краситель (Е 151, оксид железа черный (Е 172), титана диоксид (Е 171), оранжевый краситель (Е 110), хинолиновый желтый (Е 104).

24 шт. - флаконы темного стекла (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Общетонизирующий препарат растительного происхождения. Оказывает тонизирующее и психостимулирующее действие. Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гинзенозидов, эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витаминов и минералов.

Стимулирует ЦНС, уменьшая общую слабость, повышенную утомляемость, сонливость; повышает АД, умственную и физическую работоспособность, адаптационную способность организма; стимулирует половую функцию. Снижает содержание холестерина и глюкозы в крови, активирует деятельность надпочечников.

Показания к применению:

— астенические состояния различной этиологии;

— длительные и/или повышенные физические и психические нагрузки;

— период выздоровления после инфекционных заболеваний;

— для повышения сопротивляемости организма к стрессовым ситуациям и неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения
- Инфекции

Противопоказания:

— артериальная гипертензия;

— повышенная возбудимость;

— бессонница;

— кровоточивость;

— нарушения сна;

— лихорадочный синдром на фоне острых инфекционных заболеваний;

— эпилепсия;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь **взрослым** по 1 капс./сут после завтрака. Рекомендуемая продолжительность применения составляет 4-8 нед. Необходимость проведения повторного курса врач решает индивидуально.

Капсулу следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды.

Побочное действие:

При применении препарата в рекомендуемых дозах побочного действия не наблюдается.

При длительном применении в высоких дозах возможны нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, повышение АД, кожная сыпь, диарея.

Передозировка:

Симптомы: усиление побочных эффектов - повышение АД, бессонница, аллергические реакции - отек.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период лактации отсутствуют, поэтому назначение этой категории пациентов не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Гербион женьшень не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Препараты женьшеня не рекомендуется принимать во второй половине дня во избежание нарушения засыпания.

Перед приемом препарата Гербион женьшень больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом, поскольку препарат немного понижает содержание глюкозы в крови.

При назначении больным сахарным диабетом следует учитывать, что в каждой капсуле препарата содержится 21 мг лактозы.

Капсулу гидросорбента, находящуюся во флаконе, не следует проглатывать.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не выявлено отрицательного влияния препарата на способность к управлению автомобилем или работе с точными механизмами.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerbion_zhenshen