Герботон



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Эликсир для приема внутрь***	**1 л**
плоды боярышника	20 г
плоды клюквы	60 г
плоды шиповника	40 г
корневища с корнями элеутерококка	40 г
плоды черной смородины	10 г
трава эхинацеи пурпурной	30 г

Вспомогательные вещества: этанол 70% до 1 л настойки.

50 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает общетонизирующее действие, способствует повышению неспецифической резистентности организма.

Показания к применению:

— повышение неспецифической резистентности организма, физической и умственной работоспособности;

— период восстановления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

— прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания);

— диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы);

— СПИД и ВИЧ-инфекция;

— артериальная гипертензия;

— острый период течения инфекционных заболеваний;

— повышенная возбудимость;

— эпилепсия;

— травмы и заболевания головного мозга;

— бессонница;

— хронические заболевания печени;

— беременность;

— период лактации;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** по 25-40 капель, разведенных в 50-100 мл воды, 2 раза/сут (утром и днем) за 30 мин до еды. Курс лечения - 2-3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции, повышение АД, нарушения сна.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит не менее 65% этанола.

Не рекомендуется принимать препарат в вечернее время (во избежание нарушения засыпания).

Не следует принимать препараты, содержащие эхинацею, более 8 недель.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при хронических заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в прохладном, защищенном от света месте, недоступном для детей.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gerboton