Гестид



Код АТХ:

- A02AF02

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидное средство. Оказывает адсорбирующее действие, снижает газообразование в кишечнике.

Соли Mg^{2+} нейтрализуют соляную кислоту и подавляют образование пепсина.

Магния трисиликат оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие, магния гидроксид - адсорбирующее.

Альгельдрат - адсорбирующее и цитопротекторное.

Симетикон изменяет поверхностное натяжение пузырьков газа, образующихся в ЖКТ, и препятствует процессу дальнейшего газообразования.

Показания к применению:

— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

— синдром неязвенной диспепсии;

— хронический гастрит;

— изжога (в т.ч. после погрешностей в питании, злоупотребления алкоголем, кофе, никотином);

— усиленное газообразование в послеоперационном периоде;

— метеоризм;

— эзофагит;

— гастроэзофагеальный рефлюкс;

— профилактика лекарственных поражений слизистой оболочки желудка и пищевода;

— подготовка к диагностическим исследованиям.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Диспепсия
- Изжога
- Метеоризм
- Эзофагит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1-2 таб. через 1-2 ч после еды 3-4 раза/сут. При болях и изжоге применять сразу после их возникновения. Таблетки следует разжевать.

Побочное действие:

Снижение аппетита, тошнота, миастения, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Уменьшает абсорбцию диазепама, дигоксина, изониазида, фенотиазинов, антихолинергических лекарственных средств, тетрациклина, жирорастворимых витаминов (особенно витамин А).

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении необходим контроль за содержанием Al^{3+} в плазме.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gestid