

## Гевискон



### Код АТХ:

- [A02BX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Суспензия для приема внутрь (мятная)** вязкая, непрозрачная, от почти белого до кремового цвета, с мятным запахом.

	<b>10 мл</b>
натрия альгинат	500 мг
натрия гидрокарбонат	267 мг
кальция карбонат	160 мг

*Вспомогательные вещества:* карбомер, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, натрия сахарин, масло мяты перечной, натрия гидроксид, вода очищенная.

100 мл - флаконы темного стекла.

150 мл - флаконы темного стекла.

300 мл - флаконы темного стекла.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антацидный препарат. После приема внутрь препарат быстро взаимодействует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, препятствующий возникновению гастроэзофагеального рефлюкса. При

регургитации гель с большей вероятностью, чем содержимое желудка, попадает в пищевод, где уменьшает раздражение слизистой оболочки.

**Фармакокинетика**

Механизм действия препарата Гевискон не зависит от всасывания в системный кровоток.

**Показания к применению:**

— симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка, ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в т.ч. при беременности).

**Относится к болезням:**

- [Гастрит](#)
- [Диспепсия](#)
- [Отрыжка](#)

**Противопоказания:**

- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь **взрослым и детям старше 12 лет** по 10-20 мл после приема пищи и перед сном. Максимальная суточная доза - 80 мл.

**Детям 6-12 лет** назначают по 5-10 мл после приема пищи и перед сном. Максимальная суточная доза - 40 мл.

Для **пациентов пожилого возраста** изменения дозы не требуется.

**Побочное действие:**

*Редко:* аллергические реакции.

**Передозировка:**

*Симптомы:* вздутие живота.

*Лечение:* проводят симптоматическую терапию.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможно применение Гевискона при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Гевискон не установлено.

**Особые указания и меры предосторожности:**

В 10 мл суспензии содержится 141 мг (6.2 ммоль) натрия. Это следует учитывать при необходимости соблюдения

## **Гевискон**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

диеты с ограниченным содержанием соли (при застойной сердечной недостаточности, при нарушениях функции почек).

При отсутствии улучшения в течение 7 дней необходима консультация врача.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами отсутствует.

### **При нарушениях функции почек**

При нарушениях функции почек следует учитывать, что в 10 мл суспензии содержится 141 мг (6.2 ммоль) натрия

### **Применение в пожилом возрасте**

Для **пациентов пожилого возраста** изменения дозы не требуется.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат назначают внутрь **взрослым и детям старше 12 лет** по 10-20 мл после приема пищи и перед сном. Максимальная суточная доза - 80 мл.

**Детям 6-12 лет** назначают по 5-10 мл после приема пищи и перед сном. Максимальная суточная доза - 40 мл.

Противопоказан детям до 6 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Geviskon>