

## Гевискон Двойное Действие



### Код АТХ:

- [A02BX](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ *Суспензия для приема внутрь* (мятная) от почти белого до светло-коричневого цвета, с мятным запахом.

	<b>1 таб.</b>
натрия альгинат	500 мг
натрия гидрокарбонат	213 мг
кальция карбонат	325 мг

*Вспомогательные вещества:* карбомер 974Р 65 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия гидроксид 26.67 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор мятный 6 мг, вода очищенная до 10 мл.

150 мл - флаконы темного стекла.  
200 мл - флаконы темного стекла.  
300 мл - флаконы темного стекла.  
600 мл - флаконы темного стекла.  
10 мл - пакетики многослойные (4) - пачки картонные.  
10 мл - пакетики многослойные (12) - пачки картонные.  
10 мл - пакетики многослойные (24) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

При приеме внутрь препарат быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель алгината, имеющий почти нейтральное значение pH. Гель формирует защитную оболочку на поверхности содержимого желудка и действует до 4 часов, эффективно предотвращая возникновение гастроэзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки. Кальция карбонат быстро нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, облегчая ощущение изжоги. Этот эффект усиливается благодаря наличию в составе препарата натрия гидрокарбоната, который также обладает нейтрализующим действием.

#### Фармакокинетика

Механизм действия активных веществ препарата не зависит от всасывания в системный кровоток.

### Показания к применению:

— симптоматическое лечение заболеваний, связанных с нарушением пищеварения, повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке, дискомфорт после приема пищи.

### Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Изжога](#)
- [Отрыжка](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- детский возраст до 12 лет.

*С осторожностью:*

- выраженные нарушения функции почек;
- гипофосфатемия;
- гиперкальциемия;
- нефрокальциноз.

### Способ применения и дозы:

Внутрь.

**Взрослые и дети старше 12 лет:** по 10 - 20 мл после приемов пищи и перед сном (до 4-х раз в день). Максимальная суточная доза составляет 80 мл. Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

### Побочное действие:

В редких случаях (<1/10 000) возможны *аллергические реакции* (крапивница, бронхоспазм, анафилактические реакции).

Прием большого количества (больше рекомендованных доз) карбоната кальция может вызвать алкалоз, гиперкальциемию, молочно-щелочной синдром, феномен "рикошета", запор.

### Передозировка:

*Симптомы:* может отмечаться вздутие живота, метеоризм.

*Лечение:* симптоматическое.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат может применяться во время беременности и кормления грудью.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

## Гевискон Двойное Действие

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Так как кальция карбонат, входящий в состав препарата, проявляет антацидную активность, то между приемом препарата Гевискон Двойное Действие и других препаратов должно пройти не менее 2 часов (особенно при приеме блокаторов H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов, антибиотиков из группы тетрациклина, дигоксина, фторхинолонов, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, левотироксина натрия, пеницилламина, бета-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов, хлорохина и дифосфатов).

### Особые указания и меры предосторожности:

В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 127,25 мг (5,53 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием соли, например, при застойной сердечной недостаточности и нарушениях функции почек.

В 10 мл суспензии содержится 130 мг (3,25 ммоль) кальция. Поэтому следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций. Препарат Гевискон Двойное Действие содержит в составе антациды, которые могут маскировать симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возможно снижение эффективности препарата у пациентов с очень низким уровнем кислотности желудочного сока. У детей с гастроэнтеритом или с подозрением на наличие почечной недостаточности существует повышенный риск гипернатриемии. Не следует применять препарат в течение длительного времени, при отсутствии улучшения состояния в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

*Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем*

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

#### **При нарушениях функции почек**

С осторожностью при выраженных нарушениях функции почек.

#### **Применение в пожилом возрасте**

Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 12 лет.

### Условия хранения:

При температуре не выше 30°C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности:

2 года.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Geviskon\\_Dvoynoe\\_Deystvie](http://drugs.thead.ru/Geviskon_Dvoynoe_Deystvie)