Гевискон Двойное Действие



Код АТХ:

- A02BX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Суспензия для приема внутрь*** (мятная) от почти белого до светло-коричневого цвета, с мятным запахом.

	1 таб.
натрия альгинат	500 мг
натрия гидрокарбонат	213 мг
кальция карбонат	325 мг

Вспомогательные вещества: карбомер 974Р 65 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия гидроксид 26.67 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор мятный 6 мг, вода очищенная до 10 мл.

150 мл - флаконы темного стекла.
200 мл - флаконы темного стекла.
300 мл - флаконы темного стекла.
600 мл - флаконы темного стекла.
10 мл - пакетики многослойные (4) - пачки картонные.
10 мл - пакетики многослойные (12) - пачки картонные.
10 мл - пакетики многослойные (24) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

При приеме внутрь препарат быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, имеющий почти нейтральное значение pH. Гель формирует защитную оболочку на поверхности содержимого желудка и действует до 4 часов, эффективно предотвращая возникновение гастроэзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки. Кальция карбонат быстро нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, облегчая ощущение изжоги. Этот эффект усиливается благодаря наличию в составе препарата натрия гидрокарбоната, который также обладает нейтрализующим действием.

Фармакокинетика

Механизм действия активных веществ препарата не зависит от всасывания в системный кровоток.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение заболеваний, связанных с нарушением пищеварения, повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке, дискомфорт после приема пищи.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Изжога
- Отрыжка

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;

— детский возраст до 12 лет.

С осторожностью:

— выраженные нарушения функции почек;

— гипофосфатемия;

— гиперкальциемия;

— нефрокальциноз.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 10 - 20 мл после приемов пищи и перед сном (до 4-х раз в день). Максимальная суточная доза составляет 80 мл. Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

Побочное действие:

В редких случаях (<1/10 000) возможны *аллергические реакции* (крапивница, бронхоспазм, анафилактические реакции).

Прием большого количества (больше рекомендованных доз) карбоната кальция может вызвать алкалоз, гиперкальцемию, молочно-щелочной синдром, феномен "рикошета", запор.

Передозировка:

Симптомы: может отмечаться вздутие живота, метеоризм.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат может применяться во время беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Так как кальция карбонат, входящий в состав препарата, проявляет антацидную активность, то между приемом препарата Гевискон Двойное Действие и других препаратов должно пройти не менее 2 часов (особенно при приеме блокаторов H_2-гистаминовых рецепторов, антибиотиков из группы тетрациклина, дигоксина, фторхинолонов, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, левотироксина натрия, пеницилламина, бета-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов, хлорохина и дифосфатов).

Особые указания и меры предосторожности:

В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 127,25 мг (5,53 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием соли, например, при застойной сердечной недостаточности и нарушениях функции почек.

В 10 мл суспензии содержится 130 мг (3,25 ммоль) кальция. Поэтому следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций. Препарат Гевискон Двойное Действие содержит в составе антациды, которые могут маскировать симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возможно снижение эффективности препарата у пациентов с очень низким уровнем кислотности желудочного сока. У детей с гастроэнтеритом или с подозрением на наличие почечной недостаточности существует повышенный риск гипернатриемии. Не следует применять препарат в течение длительного времени, при отсутствии улучшения состояния в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью при выраженных нарушениях функции почек.

Применение в пожилом возрасте

Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

При температуре не выше 30°С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geviskon_Dvoynoe_Deystvie