

## [Гевискон Форте При Беременности](#)



### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

##### **Состав**

10 мл суспензии содержат:

*активные вещества:* натрия алгинат 1000 мг, калия гидрокарбонат 200 мг, и *вспомогательные вещества:*

суспензия для приема внутрь [анисовая]: кальция карбонат 200 мг, карбомер 40 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия гидроксид 14,44 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор фенхеля 7 мг, вода очищенная до 10 мл;

суспензия для приема внутрь [мятная]: кальция карбонат 200 мг, карбомер 40 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия гидроксид 14,44 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор мятный 6 мг, вода очищенная до 10 мл;

##### **Описание**

Суспензия для приема внутрь [анисовая]: Вязкая суспензия, от почти белого до светло-коричневого цвета, с анисовым запахом.

Суспензия для приема внутрь [мятная]: Вязкая суспензия, от почти белого до светло-коричневого цвета, с мятным запахом.

##### **Форма выпуска**

*Суспензия для приема внутрь [анисовая], суспензия для приема внутрь [мятная].*

По 80 мл, 150 мл, 200 мл, 250 мл или 300 мл во флаконы темного стекла с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Инструкция по применению находится под этикеткой.

*Суспензия для приема внутрь [мятная]:* По 10 мл суспензии в многослойных пакетиках (полиэстер, алюминий, полиэтилен). По 4, 8, 12, 16 или 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

При приеме внутрь *Гевискон® форте* быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель

альгината, препятствующий возникновению гастроэзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки.

#### **Фармакокинетика**

Механизм действия препарата *Гевискон® форте* является физическим процессом и не зависит от всасывания в системный кровоток.

### **Показания к применению:**

Симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в том числе в период беременности.

### **Относится к болезням:**

- [Гастрит](#)
- [Диспепсия](#)
- [Изжога](#)
- [Отрыжка](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 12 лет).

### **Способ применения и дозы:**

Внутрь.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 5 – 10 мл после приёмов пищи и перед сном. Максимальная суточная доза – 40 мл.

Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

Использование пакетиков: перед открытием пакетика помните его пальцами, перемешивая содержимое.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм, анафилактические реакции).

### **Передозировка:**

*Симптомы:* Может отмечаться вздутие живота.

*Лечение:* симптоматическое.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Диарея

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Так как кальция карбонат, входящий в состав препарата проявляет антацидную активность, то между приемом препарата *Гевискон® форте* и других препаратов должно пройти не менее 2 часов (особенно при одновременном приеме с блокаторами H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов, антибиотиков из группы тетрациклина, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тироксина, пенициллина, бета-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов, хлорохина и дифосфатов).

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 106 мг (4,6 ммоль) и калия 78 мг (2,0 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с очень ограниченным содержанием соли, например, в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и при нарушениях функции почек или при приеме лекарственных средств, которые могут увеличивать уровень калия в плазме.

В 10 мл суспензии содержание кальция карбоната составляет 200 мг (2,0 ммоль). Препарат следует с осторожностью принимать пациентам с гиперкальциемией, нейрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.

При отсутствии улучшения в симптоматике в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре 15 - 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности** 2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Geviskon\\_Forte\\_Pri\\_Beremennosti](http://drugs.thead.ru/Geviskon_Forte_Pri_Beremennosti)