

[Гевискон форте](#)



Код АТХ:

- [A02AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суспензия для приема внутрь (анисовая)** вязкая, от почти белого до светло-коричневого цвета, с анисовым запахом.

	10 мл
натрия альгинат	1 г
калия гидрокарбонат	200 мг

Вспомогательные вещества: кальция карбонат, карбомер, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, натрия гидроксид, натрия сахаринат, ароматизатор фенхеля, вода очищенная.

10 мл - пакетики многослойные (20) - пачки картонные.
80 мл - флаконы темного стекла.
150 мл - флаконы темного стекла.
250 мл - флаконы темного стекла.

◇ **Суспензия для приема внутрь (мятная)** вязкая, от почти белого до светло-коричневого цвета, с мятным запахом.

	10 мл
натрия альгинат	1 г
калия гидрокарбонат	200 мг

Вспомогательные вещества: кальция карбонат, карбомер, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, натрия гидроксид, натрия сахаринат, ароматизатор мятный, вода очищенная.

10 мл - пакетики многослойные (20) - пачки картонные.
80 мл - флаконы темного стекла.
150 мл - флаконы темного стекла.
250 мл - флаконы темного стекла.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат. После приема внутрь препарат быстро взаимодействует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, препятствующий возникновению гастроэзофагеального рефлюкса. При регургитации гель с большей вероятностью, чем содержимое желудка, попадает в пищевод, где уменьшает раздражение слизистой оболочки.

Фармакокинетика

Механизм действия препарата Гевискон форте не зависит от всасывания в системный кровоток.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка, ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в т.ч. при беременности).

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Диспепсия](#)
- [Отрыжка](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь **взрослым и детям старше 12 лет** по 5-10 мл после приема пищи и перед сном. Максимальная суточная доза - 40 мл.

При использовании пакетиков перед открытием их следует размять, перемешивая содержимое.

Для **пациентов пожилого возраста** изменения дозы не требуется.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: вздутие живота.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение Гевискона форте при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гевискон форте не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В 10 мл суспензии содержится 106 мг (4.6 ммоль) натрия и 78 мг (2 ммоль) калия. Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием соли (при застойной сердечной недостаточности, при нарушениях функции почек) или при одновременном приеме лекарственных средств, которые могут вызывать развитие гиперкалиемии.

Следует учитывать, что в 10 мл суспензии содержится 200 мг кальция карбоната. Поэтому следует с осторожностью назначать препарат при гиперкальциемии, нефрокальцинозе и рецидивирующем образовании почечных камней, содержащих кальций.

При отсутствии улучшения в течение 7 дней необходима консультация врача.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами отсутствует.

При нарушениях функции почек

При нарушениях функции почек следует учитывать, что в 10 мл суспензии содержится 106 мг (4.6 ммоль) натрия.

Применение в пожилом возрасте

Для **пациентов пожилого возраста** изменения дозы не требуется.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geviskon_forte