

[Гевискон \(таблетки\)](#)



Код АТХ:

- [A02BX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки жевательные (лимонные)** от почти белого до кремового цвета с небольшими вкраплениями, круглые, плоские, со скошенными краями, с изображением круга и шпаги на одной стороне и надписью "G 250" - на другой, с лимонным запахом.

	1 таб.
натрия альгинат	250 мг
натрия гидрокарбонат	133.5 мг
кальция карбонат	80 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, макрогол, магния стеарат, аспартам, коповидон, калия ацесульфам, ароматизатор лимонный.

- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
- 8 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

◇ **Таблетки жевательные (мятные)** от почти белого до кремового цвета с небольшими вкраплениями, круглые, плоские, со скошенными краями, с изображением круга и шпаги на одной стороне и надписью "G 250" - на другой, с мятным запахом.

	1 таб.
натрия альгинат	250 мг
натрия гидрокарбонат	133.5 мг
кальция карбонат	80 мг

Вспомогательные вещества: маннитол, макрогол, магния стеарат, аспартам, коповидон, калия ацесульфам, ароматизатор мятный.

- 8 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Гевискон (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

8 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат. После приема внутрь препарат быстро взаимодействует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, имеющий почти нейтральное значение pH. Гель образует защитный барьер на поверхности содержимого желудка, препятствуя возникновению гастроэзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки.

Фармакокинетика

Механизм действия препарата Гевискон не зависит от всасывания в системный кровоток.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка, ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в т.ч. при беременности).

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Диспепсия](#)
- [Отрыжка](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь (тщательно разжевывая) **взрослым и детям старше 12 лет** по 2-4 таб. после каждого приема пищи и перед сном.

Детям в возрасте до 12 лет режим дозирования устанавливает врач.

Для **пациентов пожилого возраста** изменения дозы не требуется.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: вздутие живота.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Гевискон (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Возможно применение Гевискона при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Открытые контролируемые исследования с участием 281 беременной женщины и накопленный опыт применения не продемонстрировали каких-либо значимых нежелательных эффектов применения препарата Гевискон на течение беременности или на здоровье плода и новорожденного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гевискон не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В 4 таблетках содержится 246 мг (10.6 ммоль) натрия. Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с ограниченным содержанием соли (при застойной сердечной недостаточности, при нарушениях функции почек).

В 4 таблетках содержится 320 мг (3.2 ммоль) кальция карбоната. Необходимо проявлять осторожность при назначении Гевискона пациентам с гиперкальциемией, нефрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.

В связи с тем, что в состав препарата входит аспартам, его не следует назначать пациентам с фенилкетонурией.

Существует возможность снижения эффективности препарата Гевискон у пациентов с очень низким уровнем кислотности желудочного сока.

Если после лечения в течение 7 дней симптомы диспепсии не исчезнут, необходимо провести повторную оценку клинического состояния.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами отсутствует.

При нарушениях функции почек

При нарушениях функции почек следует учитывать, что в 4 таблетках Гевискона содержится 246 мг (10.6 ммоль) натрия.

Применение в пожилом возрасте

Для **пациентов пожилого возраста** изменения дозы не требуется.

Применение в детском возрасте

Детям в возрасте до 12 лет режим дозирования устанавливает врач.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geviskon_tabletki