Гиаферон

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Суппозитории вагинальные и ректальные	**1 супп.**
интерферон альфа-2b	500 тыс.МЕ
натрия гиалуронат	12 мг

1 шт. - бумага парафинированная (10) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный - белок, полученный посредством рекомбинантной ДНК. Полипептидная структура молекулы, биологическая активность и фармакологические свойства идентичны лейкоцитарному интерферону альфа-2b.

Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный ингибирует внутриклеточные стадии развития вируса простого герпеса I и II типа, хламидий, гарднерелл, микоплазмы и уреаплазмы, оказывает противовирусное, иммуномодулирующее и антибактериальное действие.

Фармакокинетика

При ректальном введении препарата интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный всасывается через слизистую оболочку, поступает в окружающие ткани, в лимфатическую систему, обеспечивая системное иммуномодулирующее действие. За счет частичной фиксации на клетках слизистой оболочки оказывает также местное действие. При интравагинальном применении за счет высокой концентрации в очаге инфекции оказывает выраженный местный противовирусный и антибактериальный эффект. Максимальная концентрация интерферона в сыворотке крови достигается через 5 ч после введения препарата. Вследствие выраженной гидрофильности натрия гиалуронат образует дисперсный матрикс, способствует усилению активности и пролиферации клеточных элементов, ускоряет регенерацию тканей, стимулирует ангиогенез. Являясь основным структурным элементом соединительной ткани человека, натрия гиалуронат обеспечивает равномерное пролонгированное проникновение интерферона в кровоток.

Снижение уровня сывороточного интерферона через 12 ч после введения препарата обуславливает необходимость его повторного введения.

Показания к применению:

— острая и хроническая рецидивирующая герпетическая инфекция; в т.ч. половых и генерализованных форм;

— комплексная терапия заболеваний половой сферы: хламидиоз, гарднереллез, микоплазмоз и уреаплазмоз.

Относится к болезням:

- Герпес
- Инфекции
- Микоплазмоз
- Уреаплазма

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед применением с суппозитория удаляют вощаную бумагу или надрезают ячейковую упаковку.

При *герпетической инфекции*: по 1 суппозиторию ректально или вагинально 2 раза в день, ежедневно в течение 10 дней.

При *хламидиозе, гарднереллезе, микоплазмозе, уреаплазмозе*: по 1 суппозиторию 2 раза в день вагинально ежедневно в течение 20-30 дней.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится и не вызывает выраженного побочного действия. При суточной дозе интерферона альфа-2b свыше 10000000 МЕ могут наблюдаться такие явления как озноб, утомляемость, потеря аппетита, потливость. В этих случаях рекомендуется консультация лечащего врача для снижения дозы препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Гиаферон не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата во время беременности и лактации не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Гиаферон эффективен в качестве компонента комплексной терапии. В сочетании с антибактериальными и противовирусными препаратами позволяет добиться высокого терапевтического эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

Гиаферон не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

Препарат не пригоден для применения:

— целостность упаковки, которого нарушена;

— без маркировки;

— с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появления запаха прогорклого жира);

— с истекшим сроком годности.

Условия хранения:

В соответствии с СП 3.3.2.1248-03. При температуре от 2 до 8 °С. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Giaferon