Гиаферон (свечи)



Код АТХ:

- L03AB05

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Интерферон альфа-2b
- Натрия гиалуронат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории вагинальные и ректальные	**1 супп.**
интерферон альфа-2b	500 000 МЕ
натрия гиалуронат	12 мг

Вспомогательные вещества: жир кондитерский, парафин, эмульгатор Т-2.

10 шт. - бумага (1) вощаная - пачки картонные.
5 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовирусное, иммуномодулирующее.

Показания к применению:

— острая и хроническая рецидивирующая герпетическая инфекция; в т.ч. половых и генерализованных форм;

— комплексная терапия заболеваний половой сферы: хламидиоз, гарднереллез, микоплазмоз и уреаплазмоз.

Относится к болезням:

- Герпес
- Инфекции
- Микоплазмоз
- Уреаплазма

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед применением с суппозитория удаляют вощаную бумагу или надрезают ячейковую упаковку.

При *герпетической инфекции*: по 1 суппозиторию ректально или вагинально 2 раза в день, ежедневно в течение 10 дней.

При *хламидиозе, гарднереллезе, микоплазмозе, уреаплазмозе*: по 1 суппозиторию 2 раза в день вагинально ежедневно в течение 20-30 дней.

Побочное действие:

Препарат хорошо переносится и не вызывает выраженного побочного действия. При суточной дозе интерферона альфа-2b свыше 10000000 МЕ могут наблюдаться такие явления как озноб, утомляемость, потеря аппетита, потливость. В этих случаях рекомендуется консультация лечащего врача для снижения дозы препарата.

Передозировка:

Случаи передозировки препарата Гиаферон не зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата во время беременности и лактации не изучалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат Гиаферон эффективен в качестве компонента комплексной терапии. В сочетании с антибактериальными и противовирусными препаратами позволяет добиться высокого терапевтического эффекта.

Особые указания и меры предосторожности:

Гиаферон не влияет на выполнение видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами, машинным оборудованием и т.п.).

Препарат не пригоден для применения:

— целостность упаковки, которого нарушена;

— без маркировки;

— с измененными физическими свойствами (изменение цвета, появления запаха прогорклого жира);

— с истекшим сроком годности.

Условия хранения:

В соответствии с СП 3.3.2.1248-03. При температуре от 2 до 8 °С. Срок годности - 1 год.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Giaferon_svechi