

Гидрокортизон-Пос



Код АТХ:

- [S01BA02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гидрокортизон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Мазь глазная 1%** белая с желтоватым оттенком, гомогенная, суспензионная.

	1 г
гидрокортизона ацетат	10 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, ланолин.

2.5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

♦ **Мазь глазная 2.5%** белая с желтоватым оттенком, гомогенная, суспензионная.

	1 г
гидрокортизона ацетат	25 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, ланолин.

2.5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

ГКС для местного применения в офтальмологии.

При местном применении гидрокортизона ацетат подавляет воспалительные и аллергические реакции, возникающие в области наружных оболочек и переднего отрезка глаза.

Действие гидрокортизона ацетата, как и других кортикостероидов, основывается на подавлении функции

лейкоцитов и тканевых макрофагов. Ограничивает миграцию лейкоцитов, макрофагов и тучных клеток в область воспаления и подавляет образование интерлейкина-1. Способствует стабилизации лизосомальных мембран, снижая тем самым концентрацию протеолитических ферментов в области воспаления. Уменьшает проницаемость капилляров, обусловленную высвобождением гистамина. Подавляет активность фибробластов и образование коллагена. Ингибирует активность фосфолипазы A₂, что приводит к подавлению синтеза простагландинов и лейкотриенов.

Фармакокинетика

Возможно проникновение гидрокортизона ацетата через роговицу во влагу передней камеры глаза за счет липофильных свойств. Проникновение гидрокортизона ацетата в ткани зависит от состояния роговицы и значительно увеличивается в случае воспаления или повреждения слизистой глаза.

Показания к применению:

- аллергический конъюнктивит, блефарит, блефароконъюнктивит;
- острый и хронический ирит, иридоциклит;
- воспалительные явления после хирургического вмешательства на глазном яблоке;
- подавление неоваскуляризации после перенесенных кератитов, химических ожогов.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Блефарит](#)
- [Блефароконъюнктивит](#)
- [Близорукость \(миопия\)](#)
- [Иридоциклит](#)
- [Ирит](#)
- [Кератит](#)

Противопоказания:

- поверхностный герпес роговицы и другие вирусные заболевания глаз;
- нарушения целостности эпителия и повреждения роговицы;
- туберкулезная, бактериальная или грибковая инфекции глаз;
- трахома;
- период вакцинации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Полоску мази длиной 1 см закладывают за нижнее веко 2-3 раза/сут.

При одновременном применении нескольких офтальмологических лекарственных средств рекомендуется закладывать Гидрокортизон-ПОС в форме глазной мази не ранее чем через 15 мин после использования глазных капель.

Продолжительность терапии препаратом Гидрокортизон-ПОС обычно не превышает 2-3 недели.

Способ применения

Для аппликации следует слегка наклонить голову назад, заложить мазь в нижний конъюнктивальный мешок, затем закрыть глаза. Во время аппликации глазной мази следует избегать контакта тюбика с поверхностью кожи или конъюнктивы. После аппликации следует плотно закрыть тюбик.

Побочное действие:

Со стороны органа зрения: очень редко - чувство жжения, инъектированность склер, контактный дерматит, дерматоconjunctивит, экзема век. При длительном применении препарата возможно развитие вторичной глаукомы и осложненной катаракты.

Передозировка:

При местном применении в рекомендуемой дозе симптомы передозировки не отмечались.

Применение при беременности и кормлении грудью:

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата Гидрокортизон-ПОС при беременности и в период лактации отсутствуют.

Возможно применение препарата Гидрокортизон-ПОС для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. Длительность применения препарата у данной категории пациентов составляет не более 7-10 дней.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Гидрокортизона-ПОС и других средств, которые могут вызывать повышение внутриглазного давления (например, атропин и другие холинергические препараты), возможно дополнительное повышение внутриглазного давления, особенно у предрасположенных к этому больных.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении препарата более 2 недель, а также у пациентов с указаниями в анамнезе на глаукому рекомендуется регулярно контролировать внутриглазное давление.

Во время лечения препаратом Гидрокортизон-ПОС не рекомендуется пользоваться контактными линзами.

Пациент должен быть проинформирован о том, что при возникновении побочных явлений следует немедленно прекратить лечение и обратиться к офтальмологу.

Использование в педиатрии

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата Гидрокортизон-ПОС у детей отсутствуют.

Возможно применение препарата Гидрокортизон-ПОС для лечения **детей старше 1 года** по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. Длительность применения препарата у данной категории пациентов составляет не более 7-10 дней.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Сразу после аппликации препарата Гидрокортизон-ПОС возможно кратковременное нарушение остроты зрения, приводящее к замедлению психомоторных реакций. Поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта.

Применение в детском возрасте

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата Гидрокортизон-ПОС у детей отсутствуют.

Возможно применение препарата Гидрокортизон-ПОС для лечения **детей старше 1 года** по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. Длительность применения препарата у данной категории пациентов составляет не более 7-10 дней.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gidrokortizon-Pos>