Гидровит Форте



Код АТХ:

- A07CA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декстроза
- Калия хлорид
- Натрия хлорид
- Натрия цитрат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приготовления раствора для приема внутрь*** светло-коричневого цвета.

	1 пак.
декстроза безводная	4 г
калия хлорид	300 мг
натрия хлорид	700 мг
натрия цитрат дигидрат	590 мг

Вспомогательные вещества: ароматизатор лимонный - 40 мг, ароматизатор натурального черного чая - 160 мг, натрия сахарин - 20 мг, D,L-яблочная кислота - 200 мг, сухой краситель (Е150) - 20 мг.

6.03 г - пакетики из комбинированного материала (10) - пачки картонные.
6.03 г - пакетики из комбинированного материала (20) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Регидратирующий препарат для перорального применения. Лечебный эффект препарата обусловлен увеличением ОЦК, восстановлением нарушенного электролитного равновесия и коррекцией ацидоза.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гидровит форте не предоставлены.

Показания к применению:

— обезвоживание и нарушения электролитного баланса в комплексном лечении при диарее различного происхождения.

Относится к болезням:

- Баланит
- Диарея

Противопоказания:

— острая или хроническая почечная недостаточность;

— неукротимая рвота;

— потеря сознания и шок при остром недостатке жидкости;

— метаболический алкалоз;

— нарушение усвоения углеводов в кишечнике (врожденная моносахаридная мальабсорбция).

С *осторожностью* следует назначать препарат при сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, сахарном диабете.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после растворения содержимого 1 пакетика Гидровита форте в 200 мл питьевой воды. При отсутствии питьевой воды можно использовать свежекипяченую охлажденную воду или чай.

Доза Гидровита форте зависит от тяжести состояния пациента.

Общий объем принимаемого в течение 24 ч готового раствора для пациентов с *диареей от умеренной до средней тяжести с незначительной степенью обезвоживания (потеря менее 5% массы)* составляет:

— **дети грудного возраста -** от 100 до 150 мл/кг массы тела;

— **дети младшего возраста -** от 80 до 120 мл/кг массы тела;

— **дети школьного возраста -** от 50 до 80 мл/кг массы тела;

— **дети старшего возраста и взрослые -** от 20 до 60 мл/кг массы тела.

Вышеуказанные дозы имеют рекомендательный характер. Некоторым пациентам могут понадобиться меньшие или большие дозы.

Повышенные дозы могут быть полезными в начале лечения для быстрого и полного возмещения потери жидкости.

1 пакетик данного препарата содержит 4 г глюкозы. Каждая доза может содержать до 3 г глюкозы/кг массы тела.

Пациентам с тошнотой и/или рвотой, следует начинать лечение с приема небольшого количества раствора по 5-10 мл каждые 5-10 мин, увеличивая количество принимаемого раствора, в соответствии с клиническим состоянием, до рекомендованной дозы.

Детям грудного возраста, находящимся на грудном вскармливании, следует сначала дать рекомендованное количество растворенного порошка Гидровит форте, а затем накормить.

Лечение препаратом Гидровит форте следует продолжать, пока длится диарея.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: раздражение желудка, связанное с наличием в составе калия, может вызвать тошноту и рвоту.

Передозировка:

Симптомы: гипергидратация, нарушения электролитного баланса, гипергликемия.

Случайная интоксикация неразбавленным порошком может нарушить электролитный баланс и усилить диарею.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные отсутствуют, так как специальные исследования не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратом Гидровит форте действие сердечных гликозидов может быть ослаблено.

У пациентов, регулярно принимающих сердечные гликозиды, при приеме Гидровита форте необходимо контролировать концентрацию калия в крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Диарея может являться признаком серьезного заболевания (в т.ч. инфекционного). Если диарея не проходит в течение 2-3 сут и/или если общее состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Обычно у грудных детей и детей младшего возраста диарея, особенно сопровождаемая постоянной рвотой, может привести к серьезным симптомам (потеря сознания, шок). Поэтому, прежде чем начать лечение диареи у детей грудного и младшего возраста, следует проконсультироваться с врачом.

Нельзя кипятить раствор Гидровита форте.

Необходимо растворять Гидровит форте строго в указанном количестве жидкости. Раствор в меньшей концентрации не содержит оптимального количества электролитов и глюкозы, в то же время, раствор с большей концентрацией может стать причиной электролитного дисбаланса в организме.

Раствор для приема внутрь должен быть приготовлен непосредственно перед употреблением. При комнатной температуре готовый к употреблению раствор стабилен в течение 1 ч. При хранении в холодильнике раствор стабилен не более 24 ч. Все неиспользованные порции раствора должны быть уничтожены.

Пациенты с сахарным диабетом должны иметь ввиду, что один пакетик Гидровита форте содержит 4 г глюкозы.

Концентрация глюкозы в готовом растворе для приема внутрь - 111 ммоль/л. Концентрация электролитов в готовом растворе для приема внутрь: Na^+- 90 ммоль/л (60 ммоль из натрия хлорида + 30 ммоль из натрия цитрата), K^+- 20 ммоль/л, Cl^-- 80 ммоль/л (60 ммоль из натрия хлорида + 20 ммоль из калия хлорида), HCO_3^- - 10 ммоль/л. Осмоляльность готового раствора для приема внутрь - 311 мОсм/л.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.