

Гидровит Форте



Код АТХ:

- [A07CA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Декстроза](#)
- [Калия хлорид](#)
- [Натрия хлорид](#)
- [Натрия цитрат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Порошок для приготовления раствора для приема внутрь** светло-коричневого цвета.

	1 пак.
декстроза безводная	4 г
калия хлорид	300 мг
натрия хлорид	700 мг
натрия цитрат дигидрат	590 мг

Вспомогательные вещества: ароматизатор лимонный - 40 мг, ароматизатор натурального черного чая - 160 мг, натрия сахарин - 20 мг, D,L-яблочная кислота - 200 мг, сухой краситель (E150) - 20 мг.

6.03 г - пакетики из комбинированного материала (10) - пачки картонные.

6.03 г - пакетики из комбинированного материала (20) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Регидратирующий препарат для перорального применения. Лечебный эффект препарата обусловлен увеличением ОЦК, восстановлением нарушенного электролитного равновесия и коррекцией ацидоза.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гидровит форте не предоставлены.

Показания к применению:

— обезвоживание и нарушения электролитного баланса в комплексном лечении при диарее различного происхождения.

Относится к болезням:

- [Баланит](#)
- [Диарея](#)

Противопоказания:

- острая или хроническая почечная недостаточность;
- неукротимая рвота;
- потеря сознания и шок при остром недостатке жидкости;
- метаболический алкалоз;
- нарушение усвоения углеводов в кишечнике (врожденная моносахаридная мальабсорбция).

С осторожностью следует назначать препарат при сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, сахарном диабете.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь после растворения содержимого 1 пакетика Гидровита форте в 200 мл питьевой воды. При отсутствии питьевой воды можно использовать свежее кипяченую охлажденную воду или чай.

Доза Гидровита форте зависит от тяжести состояния пациента.

Общий объем принимаемого в течение 24 ч готового раствора для пациентов с *диареей от умеренной до средней тяжести с незначительной степенью обезвоживания (потеря менее 5% массы)* составляет:

- **дети грудного возраста** - от 100 до 150 мл/кг массы тела;
- **дети младшего возраста** - от 80 до 120 мл/кг массы тела;
- **дети школьного возраста** - от 50 до 80 мл/кг массы тела;
- **дети старшего возраста и взрослые** - от 20 до 60 мл/кг массы тела.

Вышеуказанные дозы имеют рекомендательный характер. Некоторым пациентам могут понадобиться меньшие или большие дозы.

Повышенные дозы могут быть полезными в начале лечения для быстрого и полного возмещения потери жидкости.

1 пакетик данного препарата содержит 4 г глюкозы. Каждая доза может содержать до 3 г глюкозы/кг массы тела.

Пациентам с тошнотой и/или рвотой, следует начинать лечение с приема небольшого количества раствора по 5-10 мл каждые 5-10 мин, увеличивая количество принимаемого раствора, в соответствии с клиническим состоянием, до рекомендованной дозы.

Детям грудного возраста, находящимся на грудном вскармливании, следует сначала дать рекомендованное количество растворенного порошка Гидровит форте, а затем накормить.

Лечение препаратом Гидровит форте следует продолжать, пока длится диарея.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: раздражение желудка, связанное с наличием в составе калия, может вызвать тошноту и рвоту.

Передозировка:

Симптомы: гипергидратация, нарушения электролитного баланса, гипергликемия.

Случайная интоксикация неразбавленным порошком может нарушить электролитный баланс и усилить диарею.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные отсутствуют, так как специальные исследования не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с препаратом Гидровит форте действие сердечных гликозидов может быть ослаблено.

У пациентов, регулярно принимающих сердечные гликозиды, при приеме Гидровита форте необходимо контролировать концентрацию калия в крови.

Особые указания и меры предосторожности:

Диарея может являться признаком серьезного заболевания (в т.ч. инфекционного). Если диарея не проходит в течение 2-3 сут и/или если общее состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.

Обычно у грудных детей и детей младшего возраста диарея, особенно сопровождаемая постоянной рвотой, может привести к серьезным симптомам (потеря сознания, шок). Поэтому, прежде чем начать лечение диареи у детей грудного и младшего возраста, следует проконсультироваться с врачом.

Нельзя кипятить раствор Гидровита форте.

Необходимо растворять Гидровит форте строго в указанном количестве жидкости. Раствор в меньшей концентрации не содержит оптимального количества электролитов и глюкозы, в то же время, раствор с большей концентрацией может стать причиной электролитного дисбаланса в организме.

Раствор для приема внутрь должен быть приготовлен непосредственно перед употреблением. При комнатной температуре готовый к употреблению раствор стабилен в течение 1 ч. При хранении в холодильнике раствор стабилен не более 24 ч. Все неиспользованные порции раствора должны быть уничтожены.

Пациенты с сахарным диабетом должны иметь ввиду, что один пакетик Гидровита форте содержит 4 г глюкозы.

Концентрация глюкозы в готовом растворе для приема внутрь - 111 ммоль/л. Концентрация электролитов в готовом растворе для приема внутрь: Na^+ - 90 ммоль/л (60 ммоль из натрия хлорида + 30 ммоль из натрия цитрата), K^+ - 20 ммоль/л, Cl^- - 80 ммоль/л (60 ммоль из натрия хлорида + 20 ммоль из калия хлорида), HCO_3^- - 10 ммоль/л.

Осмоляльность готового раствора для приема внутрь - 311 мОсм/л.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

