

## Гинепристон



### Код АТХ:

- [G03XB01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Мифепристон](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** от светло-желтого до светло-желтого с зеленоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические.

	<b>1 таб.</b>
мифепристон	10 мг

**Вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая - 74.6 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 4.5 мг, кальция стеарат - 900 мкг.

- 1 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 2 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 1 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 2 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Синтетический стероидный антигестагенный препарат, (блокирует действие прогестерона на уровне рецепторов), гестагенной активностью не обладает. Отмечается антагонизм с глюкокортикоидами (за счет конкуренции на уровне связи с рецепторами).

Повышает сократительную способность миометрия, стимулируя высвобождение интерлейкина-8 в хориодецидуальных клетках и повышая чувствительность миометрия к простагландинам. В зависимости от фазы менструального цикла вызывает торможение овуляции, изменение эндометрия и препятствует имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

#### Фармакокинетика

**Всасывание**

После однократного приема внутрь в дозе 600 мг  $C_{\max}$  достигается через 1.3 ч и составляет 1.98 мг/л. Абсолютная биодоступность составляет 69%.

**Распределение**

Связывание с белками плазмы крови (с альбумином и кислым  $\alpha_1$ -гликопротеином) составляет 98%.

**Выведение**

$T_{1/2}$  - 18 ч. Выведение осуществляется в две фазы: сначала медленное выведение препарата (концентрация мифепристона в плазме крови уменьшается в 2 раза между 12-72 ч), затем фаза быстрого выведения.

**Показания к применению:**

— экстренная посткоитальная контрацепция (после незащищенного полового акта или если примененный способ контрацепции не может считаться надежным).

**Относится к болезням:**

- [Контрацепция](#)

**Противопоказания:**

- надпочечниковая недостаточность;
- длительное применение ГКС;
- острая или хроническая почечная недостаточность;
- острая или хроническая печеночная недостаточность;
- наличие тяжелой экстрагенитальной патологии;
- повышенная чувствительность к мифепристону (в анамнезе).

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушении гемостаза (в т.ч. предшествующем лечении антикоагулянтами), хронических обструктивных заболеваниях легких (в т.ч. бронхиальной астме), тяжелой артериальной гипертензии, нарушениях ритма сердца, хронической сердечной недостаточности.

**Способ применения и дозы:**

Препарат назначают внутрь в разовой дозе 10 мг (1 таб.) в течение 72 ч после незащищенного полового акта.

Для сохранения контрацептивного эффекта следует воздержаться от приема пищи за 2 ч до применения препарата и в течение 2 ч после приема.

Гинепристон можно применять в любую фазу менструального цикла.

**Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота.

*Со стороны ЦНС:* головокружение, головная боль.

*Со стороны половой системы:* кровянистые выделения из половых путей, нарушения менструального цикла.

*Аллергические реакции:* крапивница.

*Прочие:* чувство дискомфорта в низу живота, слабость, гипертермия.

## **Передозировка:**

Прием Гинепристона в дозах до 2 г не вызывает нежелательных реакций.

*Симптомы:* возможна надпочечниковая недостаточность.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Гинепристон противопоказан к применению при беременности.

Следует прекратить грудное вскармливание на 14 дней после приема препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Гинепристон не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Гинепристон не рекомендуется для регулярного применения в качестве плановой постоянной контрацепции.

Применение препарата Гинепристон не защищает от заболеваний, передающихся половым путем и СПИД.

Следует избегать одновременного приема Гинепристона с НПВС.

### ***При нарушениях функции почек***

Противопоказание: острая или хроническая почечная недостаточность

### ***При нарушениях функции печени***

Противопоказание: острая или хроническая печеночная недостаточность

## **Условия хранения:**

Список А. Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30°C. Срок годности – 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ginepriston>