Гинезол 7 (крем)



Код АТХ:

- G01AF04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Миконазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Крем вагинальный 2%*** белого цвета.

	1 г
миконазола нитрат	20 мг

Вспомогательные вещества: бензойная кислота, бутилата гидроксианизол, масло минеральное, пегликоль-5-олеат, пегоксоль-7-стеарат, вода очищенная.

45 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Миконазол сочетает в себе противогрибковое действие по отношению к дерматофитам (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis), дрожжам (Candida albicans, Candida glabrata и др. видов Candida) и различным другим грибам (Malassezia furtur, Aspergilus niger, Penicillium crustaceum) с антибактериальным действием по отношению к определенным грамположительным бактериям. Миконазол подавляет биосинтез эргостерина в грибках и изменяет состав других липидных компонентов в мембране, что приводит к некрозу грибковых клеток. Миконазол очень быстро устраняет зуд, часто сопровождающий инфекции, вызванные дрожжами и дерматофитами. Не изменяет состав микрофлоры и pH влагалища.

Фармакокинетика

После введения крема во влагалище высвобождается активная суспензия. Системная абсорбция после интравагинального применения ограничена. Через 8 ч после применения препарата 90% миконазола все еще присутствует во влагалище. Неизменный миконазол не обнаруживается ни в плазме, ни в моче.

Показания к применению:

Местное лечение:

— вульвовагинального кандидоза;

— вторичных инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Относится к болезням:

- Вульвит
- Инфекции

Противопоказания:

— индивидуальная повышенная чувствительность к имидазолам или другим компонентам препарата;

— детский возраст до 12 лет;

— беременность (I триместр).

В период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

С *осторожностью:* сахарный диабет, нарушение микроциркуляции, период беременности (II и III триместр).

Способ применения и дозы:

Наружно наносят небольшое количество крема на слизистые оболочки наружных половых органов и/или вводят во влагалище с помощью аппликатора один раз в сутки на ночь в течение 6-7 дней.

Побочное действие:

Побочные реакции возникают редко и в большинстве случаев слабо выражены.

Возможны аллергические реакции (местное раздражение, зуд, чувство жжения, особенно в начале лечения).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Во II и III триместрах беременности препарат можно применять только в тех случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.

При применении в период лактации следует отменить грудное вскармливание препарат следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание повреждения резины.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении аллергической реакции, лечение следует прекратить. При необходимости препарат может быть удален путем промывания влагалища кипяченой водой.

Для предотвращения реинфицирования следует соблюдать правила гигиены. При наличии инфекции у полового

партнера, ему также следует назначить соответствующее лечение.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 30°С, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Не использовать по окончании срока годности указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginezol_7_krem