Гинезол 7 (свечи)



Код АТХ:

- G01AF04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Миконазол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Суппозитории вагинальные*** белого или почти белого цвета, цилиндрической формы с закругленным концом.

	1 супп.
миконазола нитрат	100 мг

Вспомогательные вещества: масло растительное гидрогенизированное.

7 шт. - блистеры (1) в комплекте с аппликатором - коробки картонные.

◊ ***Суппозитории вагинальные*** белого или почти белого цвета, в форме вытянутой оливы.

	1 супп.
миконазола нитрат	100 мг

Вспомогательные вещества: масло растительное гидрогенизированное.

7 шт. - блистеры (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противогрибковое.

Показания к применению:

Местное лечение:

— вульвовагинального кандидоза;

— вторичных инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Относится к болезням:

- Вульвит
- Инфекции

Противопоказания:

— индивидуальная повышенная чувствительность к имидазолам или другим компонентам препарата;

— детский возраст до 12 лет;

— беременность (I триместр).

С *осторожностью* : сахарный диабет, нарушение микроциркуляции.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют вагинально. Вводят глубоко во влагалище по 1 суппозиторию перед сном в течение 6-7 дней.

Побочное действие:

Побочные реакции возникают редко и в большинстве случаев слабо выражены (местное раздражение, зуд, чувство жжения, особенно в начале лечения).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Во II и III триместрах беременности препарат можно применять только в тех случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.

Не известно проникает ли миконазол в грудное молоко, тем не менее, во время грудного вскармливания препарат следует применять с осторожностью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание повреждения латекса.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении аллергической реакции лечение следует прекратить. При необходимости препарат может быть удален путем промывания влагалища кипяченой водой.

Для предотвращения реинфицирования следует соблюдать правила гигиены. При наличии инфекции у полового партнера ему также следует назначить соответствующее лечение.

Не следует пользоваться тампонами во время применения суппозиториев

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 30°С, в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginezol_7_svechi