

[Гинезол 7 \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [G01AF04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Миконазол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ **Суппозитории вагинальные** белого или почти белого цвета, цилиндрической формы с закругленным концом.

	1 супп.
миконазола нитрат	100 мг

Вспомогательные вещества: масло растительное гидрогенизированное.

7 шт. - блистеры (1) в комплекте с аппликатором - коробки картонные.

◊ **Суппозитории вагинальные** белого или почти белого цвета, в форме вытянутой оливы.

	1 супп.
миконазола нитрат	100 мг

Вспомогательные вещества: масло растительное гидрогенизированное.

7 шт. - блистеры (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противогрибковое.

Показания к применению:

Местное лечение:

- вульвовагинального кандидоза;
- вторичных инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- индивидуальная повышенная чувствительность к имидазолам или другим компонентам препарата;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность (I триместр).

С осторожностью : сахарный диабет, нарушение микроциркуляции.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют вагинально. Вводят глубоко во влагалище по 1 суппозиторию перед сном в течение 6-7 дней.

Побочное действие:

Побочные реакции возникают редко и в большинстве случаев слабо выражены (местное раздражение, зуд, чувство жжения, особенно в начале лечения).

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности.

Во II и III триместрах беременности препарат можно применять только в тех случаях, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода.

Не известно проникает ли миконазол в грудное молоко, тем не менее, во время грудного вскармливания препарат следует применять с осторожностью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать контакта препарата с изделиями из латекса (контрацептивные диафрагмы и презервативы) во избежание повреждения латекса.

Особые указания и меры предосторожности:

При возникновении аллергической реакции лечение следует прекратить. При необходимости препарат может быть удален путем промывания влагалища кипяченой водой.

Для предотвращения реинфицирования следует соблюдать правила гигиены. При наличии инфекции у полового партнера ему также следует назначить соответствующее лечение.

Не следует пользоваться тампонами во время применения суппозиториев

Условия хранения:

Хранить при температуре от 15 до 30°C, в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginezol_7_svechi