

Гинкго Двулопастного Листья



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гинкго двулопастного листьев экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Сырье растительное - порошок	1 фильтр-пакет
листья гинкго двулопастного	2 г

2 г - фильтр-пакеты (10) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (24) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (30) - пачки картонные.
2 г - фильтр-пакеты (50) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат улучшает мозговое и периферическое кровообращение, способствует уменьшению проницаемости сосудистой стенки, повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, улучшает реологические свойства крови.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии пациентам с дисциркуляторной энцефалопатия, в том числе пациентам пожилого возраста, сопровождающейся:

- расстройством внимания и/или памяти;
- головокружением;
- шумом в ушах;

— нарушением сна.

В составе комплексной терапии в случаях нарушения кровообращения нижних конечностей.

Относится к болезням:

- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- пониженная свертываемость крови;
- эрозивный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- острые нарушения мозгового кровообращения;
- острый инфаркт миокарда;
- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы:

1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, накрывают крышкой и настаивают в течение 10 мин. Затем фильтр-пакет отжимают и доводят объем полученного настоя до 100 мл.

Принимают внутрь по 100 мл 3 раза в день после еды. Курс лечения 25-30 дней.

Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические кожные реакции (покраснение, кожная сыпь, отечность, зуд), нарушения функции ЖКТ (тошнота, рвота, диарея), головная боль, снижение свертываемости крови, нарушения слуха, головокружение, бессонница. В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений, прием препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат не следует принимать пациентам, систематически принимающим ацетилсалициловую кислоту, варфарин,

тиазидные диуретики, трициклические антидепрессанты, противосудорожные препараты, гентамицин.

Особые указания и меры предосторожности:

При часто возникающих ощущениях головокружения и шума в ушах необходимо проконсультироваться с врачом.

При внезапном ухудшении или потере слуха следует немедленно обратиться к врачу.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Настой хранить в прохладном месте не более 2-х суток.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginkgo_Dvulopastnogo_Listya