Гинкор Форт



Код АТХ:

- C05C

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капсулы*** с непрозрачной зеленой крышечкой и непрозрачным желтым корпусом, размер №0; содержимое капсул - спрессованный порошок светло-желтого цвета с характерным запахом.

	1 капс.
стандартизированный экстракт гинкго билоба (EGb 761)	14 мг,
в т.ч. гинкго гетерозидов	24%
гинкголидов-билобалидов	6%
гептаминола гидрохлорид	300 мг
троксерутин	300 мг

Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный 2 мг, магния стеарат 9 мг.

Состав корпуса капсулы: железа оксид желтый (E172), титана диоксид (E171), желатин.
Состав крышечки капсулы: железа оксид желтый (E172), индигокармин (E132), титана диоксид (E171), желатин.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, применяемый при нарушениях венозного кровообращения. Обладает капилляропротекторной активностью: повышает устойчивость стенки капилляров к повреждению, уменьшает проницаемость сосудистых стенок, улучшает микроциркуляцию и венозный кровоток. Уменьшает болевые ощущения.

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

— нарушения венозного кровообращения нижних конечностей, проявляющиеся ощущением тяжести, парестезиями, болями в ногах;

— хронический геморрой.

Относится к болезням:

- Геморрой

Противопоказания:

— гипертиреоз;

— одновременное применение ингибиторов МАО.

Способ применения и дозы:

При *венозно-лимфатической недостаточности (в т.ч. при хроническом геморрое)* назначают по 1 капс. 2 раза/сут утром и вечером.

При *остром геморрое* назначают по 3-4 капс./сут утром и вечером, курс лечения обычно составляет 5-15 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка:

Симптомы: повышение АД, тахикардия.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата Гинкор Форт по показаниям во II и III триместрах беременности.

В экспериментальных исследованиях установлено, что препарат не оказывает тератогенного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Гинкор Форт с ингибиторами МАО возможно повышение АД.

Особые указания и меры предосторожности:

Гептаминол, входящий в состав препарата, может вызвать положительную реакцию при антидопинговом контроле у спортсменов.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре от 15° до 25°С.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginkor_Fort