Гинкор Гель



Код АТХ:

- C05C

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** желтого цвета, прозрачный; допускается наличие пузырьков воздуха.

	100 г
сухой стандартизированный экстракт гинкго билоба	140 мг,
в т.ч. гинкго флавонолгликозидов	24%
гинкголидов-билобалидов	6%
троксерутин	3 г

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат 120 мг, пропилпарагидроксибензоат 30 мг, динатрия эдетат 20 мг, карбомер (карбоксиполиметилен) 1.2 г, изопропанол 8 г, вода очищенная (до 100 г).

40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, применяемый при нарушениях венозного кровообращения. Увеличивает сопротивляемость капилляров, уменьшает их повышенную проницаемость, оптимизирует тонус сосудов, регулирует емкость капилляров. Способствует увеличению потребления глюкозы, выведению лактатов и других продуктов метаболизма и восстановлению аэробного гликолиза в тканях.

Оказывает противоотечное действие, уменьшает транссудацию протеинов плазмы и инфильтрацию лейкоцитов за счет ингибирования фосфолипазы А2, липооксигеназы и блокирования фактора активации тромбоцитов.

Обладает антиоксидантными свойствами, блокирует свободные радикалы и оказывает защитное действие на лизосомальные мембраны.

Повышает устойчивость эндотелиальных клеток венозных сосудов к гипоксии, ингибирует расщепление коллагеновых микроволокон и нормализует функции гладкой мускулатуры сосудов.

Улучшает реологические свойства крови за счет повышения резистентности мембран эритроцитов и снижения их

агрегации. При гиперагрегации тромбоцитов применение препарата снижает вероятность образования тромбов.

Показания к применению:

— функциональные проявления хронической венозной недостаточности нижних конечностей с явлениями воспаления и трофическими нарушениями кожи;

— кровоподтеки и местные гематомы, чувство жжения и судороги в нижних конечностях;

— болезненные воспалительные реакции на введение инъекционных препаратов для лечения варикозного расширения вен;

— поверхностный флебит.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Воспаление
- Гематомы
- Судороги
- Флебит

Противопоказания:

В настоящее время противопоказания не установлены.

Способ применения и дозы:

Количество применяемого препарата зависит от размера обрабатываемого участка кожи. Например, количества геля, приблизительно соответствующего по объему лесному ореху, достаточно для обработки площади задней поверхности голени. Препарат наносят 2-4 раза в сутки, при этом одновременно делают легкий массаж.

Побочное действие:

Возможно: местные реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Гинкор гель не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

В *экспериментальных исследованиях* установлено, что препарат не оказывает тератогенного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Гинкор гель с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Гинкор гель не следует наносить на слизистые оболочки, а также на участки кожи с экземой или открытыми

изъязвлениями.

Следует избегать воздействия солнечных лучей на обработанные препаратом участки кожи.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ginkor_Gel