

## [Гино-Певарил \(свечи\)](#)



### **Код АТХ:**

- [G01AF05](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Эконазол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

*Суппозитории, 50 мг.* По 5 супп. в блистере из ПВХ и ПЭНП; по 3 блистера в картонной пачке.

*Суппозитории, 150 мг.* По 3 супп. в блистере из ПВХ и ПЭНП; по 1 блистеру в картонной пачке.

### **Состав:**

Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
эконазола нитрат	50 мг
	150 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> твердый жир (тип А и тип Б)	

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие — противогрибковое.

## Показания к применению:

— лечение вульвовагинальных микозов.

## Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Микоз](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;

— детский возраст до 16 лет.

*С осторожностью.* Данные о применении Гино-Певарила у пожилых лиц (старше 65 лет) недостаточны.

## Способ применения и дозы:

Интравагинально.

*Суппозитории по 50 мг*

Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение не менее 14 дней. Необходимо провести полный курс лечения, несмотря на исчезновение субъективных симптомов (зуд, бели).

*Суппозитории по 150 мг*

Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище, в положении лежа, непосредственно перед сном в течение 3-х дней.

В случае рецидива или положительного результата культурального исследования через 1 неделю после проведенного лечения проводят второй курс лечения.

## Побочное действие:

При применении Гино-Певарила очень редко может наблюдаться местное раздражение, чувство жжения, зуд, эритема, сыпь. Известны отдельные случаи возникновения аллергических реакций, таких как ангионевротический отек и крапивница.

## Передозировка:

До настоящего времени сведений о передозировке не имеется. При случайном приеме препарата внутрь могут возникнуть тошнота, рвота и диарея. В таких случаях при необходимости следует проводить симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

*Беременность*

Гино-Певарил способен всасываться из влагалища в системный кровоток, поэтому его не следует применять в течение первого триместра беременности, если только врач не решит, что лечение этим препаратом важно для здоровья пациентки. Во время второго и третьего триместров беременности Гино-Певарил можно применять, если его потенциальная польза для женщины превосходит возможный риск для плода.

*Лактация*

Неизвестно, проникает ли эконазола нитрат в грудное молоко. В период кормления грудью препарат следует применять с осторожностью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Соответствующих исследований не проводилось. Учитывая химическую схожесть эконазола с производными имидазола, существует вероятность конкурентного взаимодействия эконазола нитрата с веществами, метаболизируемыми ферментами CYP3A4/2C29. Однако, принимая во внимание, что препарат слабо всасывается в системный кровоток, возникновение клинически значимых взаимодействий маловероятно. Пациенты, принимающие оральные антикоагулянты, такие как варфарин и аценокумарол, должны соблюдать осторожность и следить за параметрами свертываемости крови.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Одновременное применение латексных презервативов или диафрагм и вагинальных противoinфекционных препаратов может снижать эффективность латексных барьерных контрацептивов. По этой причине Гино-Певарил не рекомендуется использовать одновременно с диафрагмой или презервативом. Пациенты, использующие спермицидные контрацептивы, должны посоветоваться со своим врачом, поскольку препараты, назначаемые для интравагинального введения, могут инактивировать спермицидный контрацептив.

Гино-Певарил не следует использовать в сочетании с другими препаратами для лечения заболеваний гениталий, назначаемыми внутрь или наружно.

В случае возникновения сильного раздражения лечение Гино-Певарилом необходимо прекратить.

У пациентов, чувствительных к имидазолам, возможна повышенная чувствительность и к эконазола нитрату. Препарат не предназначен для перорального применения.

*Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами.*

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

## **Условия хранения:**

Препарат хранить при температуре от 15 до 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать после истечения срока годности.

## **Срок годности:**

5 лет.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gino-Pevaril\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Gino-Pevaril_svechi)