

## [Гино-Травоген Овулум \(свечи\)](#)



### **Код АТХ:**

- [G01AF07](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Изоконазол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Суппозитории вагинальные** белого или желтовато-белого цвета, однородные на продольном срезе; допускается наличие воздушного стержня.

	<b>1 супп.</b>
изоконазола нитрат	600 мг

*Вспомогательные вещества:* жир твердый.

1 шт. - блистеры пластиковые (1) в комплекте с напальчниками (2 шт.) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие — антибактериальное, противогрибковое, фунгистатическое.

### **Показания к применению:**

— грибковые инфекции влагалища, в т.ч. смешанные инфекции, вызванные грамположительными бактериями.

### **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных компонентов.

Не рекомендуется применение у детей до 18 лет в связи с недостаточностью данных о применении в данной возрастной категории.

## Способ применения и дозы:

Интравагинально. Вагинальный суппозиторий вводят глубоко во влагалище. Лучше всего это делать в положении лежа, в вечернее время непосредственно перед сном, 1 раз/сут однократно. Для облегчения введения следует использовать прилагаемые напальчники. Лечение не следует проводить по время менструации.

## Побочное действие:

При применении препарата могут отмечаться местные реакции, такие как болезненность, жжение и зуд. В редких случаях возможно развитие аллергических реакций в месте применения препарата.

## Передозировка:

Согласно результатам исследований токсичности разовой дозы, активное вещество изоконазола нитрат может быть классифицировано как практически нетоксичное. Отсутствует риск развития острой интоксикации после разового применения препарата в высокой дозе или случайного приема внутрь одного суппозитория.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Опыт использования содержащих изоконазол препаратов во время беременности не указывает на наличие у них риска тератогенности для человека.

В связи с очень небольшой абсорбцией (менее 5% введенной дозы) и очень короткой продолжительностью терапии, можно исключить вероятность вреда, обусловленного попаданием изоконазола нитрата в материнское молоко, для ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

## Особые указания и меры предосторожности:

Для лечения грибковых поражений наружных половых органов или для одновременного профилактического лечения полового партнера рекомендуется применять крем Травоген.

Не рекомендуется проводить спринцевание во время лечения, а также в течение недели после лечения.

Для предупреждения повторного инфицирования рекомендуется ежедневно менять и кипятить личные бельевые принадлежности (полотенца, нижнее белье - предпочтительно из хлопка).

*Влияние на способность к вождению автомобиля и работе с механизмами*

Не наблюдалось.

## Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C, в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

5 лет.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gino-Travogen\\_Ovulum\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Gino-Travogen_Ovulum_svechi)