


Гинос



Код АТХ:

- [N06DX02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гинкго двулопастного листьев экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой кирпично-красного цвета, круглые, двояковыпуклые; на поперечном разрезе видны два слоя.

	1 таб.
сухой экстракт листьев гинкго двулопастного	40 мг
содержание суммы флавоноидов	24%

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал кукурузный, поливинилпирролидон (повидон), натрия карбоксиметилкрахмал (примогель), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Состав оболочки: Opadry II.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
30 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Нейротропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения, улучшающий мозговое и периферическое кровообращение. Биологически активные вещества экстракта гинкго билоба (стандартизированные до содержания 9.6 мг гинкгофлавоногликозидов и 2.4 мг терпенлактонов /гинкголиды и билобалиды/ в 40 мг экстракта) способствуют укреплению и повышению эластичности сосудистой стенки, улучшают реологические свойства крови, что приводит к улучшению микроциркуляции, повышает снабжение мозга и периферических тканей кислородом и глюкозой. Препарат улучшает мозговое кровообращение, обладает церебропротекторными свойствами. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки и снижает отечность тканей.

Нормализует обмен веществ в клетках, препятствует агрегации эритроцитов, ингибирует агрегацию тромбоцитов. Препятствует повышению фибринолитической активности крови, образованию свободных радикалов и перекисному окислению липидов клеточных мембран. Расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, регулирует кровенаполнение сосудов. Повышает устойчивость организма к гипоксии, особенно тканей головного мозга, тормозит развитие травматического или токсического отека головного мозга.

Фармакокинетика

Фармакокинетические параметры экстракта гинкго билоба трудно поддаются оценке из-за многокомпонентного состава экстракта.

Показания к применению:

- дисциркуляторная энцефалопатия различной этиологии (инсульт, черепно-мозговая травма, престарелый возраст), проявляющаяся следующими симптомами: снижение внимания, нарушения памяти, нарушение интеллектуальных способностей, чувство тревоги, страха, нарушения сна;
- нарушения периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч. артериопатия нижних конечностей), синдром Рейно;
- нейросенсорные нарушения, проявляющиеся головокружением, шумом в ушах, неустойчивостью походки.

Относится к болезням:

- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Нарушение памяти](#)
- [Травмы](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

- пониженная свертываемость крови;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- эрозивный гастрит;
- детский возраст до 12 лет;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* назначают при острых нарушениях мозгового кровообращения, артериальной гипотензии.

Способ применения и дозы:

Для *симптоматической терапии расстройств мозгового кровообращения* препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут. Продолжительность терапии - не менее 8 недель.

При *нарушениях периферического кровообращения* по 1 таб. 3 раза/сут. Продолжительность терапии - 6-8 недель.

При *нейросенсорных нарушениях* препарат назначают по 1 таб. 3 раза/сут. Продолжительность курса терапии - 6-8 недель.

При необходимости возможно назначение повторных курсов терапии.

Таблетки, покрытые оболочкой, следует принимать утром, днем и вечером, независимо от приема пищи, проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.

Если прием таблетки был пропущен или принята недостаточная доза, последующий прием проводят как указано, без каких-либо изменений.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: редко - головная боль.

Со стороны пищеварительной системы: редко - явления диспепсии.

Аллергические реакции: возможны кожная сыпь, зуд.

Прочие: снижение свертываемости крови.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Применение препарата одновременно с ацетилсалициловой кислотой и пероральными антикоагулянтами не рекомендуется.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендованные дозы препарата.

Улучшение состояния обычно наблюдается через 1 месяц терапии.

На фоне применения препарата не следует употреблять алкоголь.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ginos>