

[Гинсана](#)



Код АТХ:

- [A13A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Женьшень](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы	1 капс.
экстракт женьшеня G115 стандартизированный	100 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Представляет собой стандартизированный экстракт женьшеня G115, изготовленный из специально отобранного высококачественного корня женьшеня (*Panax ginseng* C.A. Meyer) по технологии, позволяющей сохранить максимальное количество активных веществ. Действие экстракта женьшеня G115 обусловлено высоким содержанием 8 важнейших типов гинсенозидов: Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rf, Rg1, Rg2.

Гинсана улучшает клеточный метаболизм и усвоение кислорода клетками организма, усиливает физическую и умственную работоспособность, повышает неспецифический иммунитет.

Время начала и выраженность действия препарата Гинсана зависят от индивидуальных особенностей. Чаще всего положительный эффект отмечается в начале 2-3-й недели приема препарата.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Гинсана не предоставлены.

Показания к применению:

- усталость;
- астения;
- снижение способности к концентрации внимания;
- период реконвалесценции.

Относится к болезням:

- [Астения](#)
- [Реконвалесценция](#)

Противопоказания:

В настоящее время противопоказания не установлены.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают 2 капс. во время завтрака или по 1 капс. во время завтрака и обеда.

При тяжелых состояниях в начале лечения доза может быть увеличена до 4 капсул.

Рекомендуется принимать капсулы препарата Гинсана курсами по 1-2 мес.

Капсулы следует запивать водой.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие до настоящего времени не выявлено.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Гинсана не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применять препарат Гинсана при беременности и в период лактации следует только по назначению врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Гинсана с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Препараты растительного происхождения, стимулирующие ЦНС, не рекомендуют применять при выраженном повышении АД, повышенной возбудимости, эпилепсии, судорожных состояниях, расстройствах сна, острых инфекционных заболеваниях.

Капсулы не содержат сахара, поэтому могут применяться у больных сахарным диабетом.

Гинсана не относится к допинговым средствам и не вызывает формирования лекарственной зависимости.

Гинсана

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Использование в педиатрии

Не рекомендуют применять препарат у **детей в возрасте до 12 лет**.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Гинсана не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуют применять препарат у **детей в возрасте до 12 лет**.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Срок годности:

3 года.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ginsana>