

Гиоксизон



Код АТХ:

- [D07CA01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гидрокортизон](#)
- [Окситетрациклин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	1 г
окситетрациклина гидрохлорид	30 мг
гидрокортизона ацетат	10 мг

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, угнетает развитие воспалительных реакций кожи, особенно аллергического происхождения, осложненных бактериальной инфекцией, в результате суммарного действия компонентов, входящих в состав препарата.

Окситетрациклин - антибиотик из группы тетрациклинов, оказывает бактериостатическое действие.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Rickettsia* spp., *Treponema* spp., *Mycoplasma* spp.

Гидрокортизон - ГКС, оказывает противовоспалительный, противоаллергический, антиэкссудативный и противоудный эффекты. Тормозит фагоцитоз; уменьшает синтез простагландинов и лейкотриенов путем угнетения активности фосфолипазы A₂ и уменьшения высвобождения арахидоновой кислоты из фосфолипидов клеточных оболочек. Угнетает освобождение интерлейкинов и других цитокинов, вызывающих воспалительный процесс; тормозит высвобождение гистамина и возникновение местных аллергических реакций. Снижает синтез белков и отложение коллагена в коже, препятствует развитию соединительной ткани, ослабляет пролиферативные процессы.

Показания к применению:

У взрослых и детей старше 8 лет:

- инфицированная опрелость;
- фолликулиты;
- фурункулез;
- карбункул;
- импетиго;
- рожа;
- инфицированные экземы и раны;
- эрозии;
- крапивница новорожденного;
- простой и аллергический дерматит;
- себорея;
- солнечная эритема;
- мультиформная экссудативная эритема;
- укусы насекомых;
- аллергические и гнойные заболевания наружного слухового прохода;
- варикозные язвы голени;
- ожоги, обморожения.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Варикоз](#)
- [Варикозные язвы](#)
- [Дерматит](#)
- [Импетиго](#)
- [Карбункул](#)
- [Крапивница](#)
- [Обморок](#)
- [Ожоги](#)
- [Раны](#)
- [Рожа](#)
- [Себорея](#)
- [Фолликулит](#)
- [Фурункул](#)
- [Экзема](#)
- [Эритема](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- туберкулез кожи;
- опухоли кожи;
- предраковые состояния;
- микоз;

- вирусные заболевания кожи (герпес, ветряная оспа);
- беременность;
- период лактации (при применении на обширных очагах поражения).

Способ применения и дозы:

Местно, наружно.

Мазь в количестве 0.5-1 г наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза/сут или под стерильную марлевую повязку. Длительность лечения индивидуальна.

Побочное действие:

Редко возможны - аллергические реакции, раздражение кожи, зуд, сыпь.

При *длительном применении и/или нанесении на большие поверхности* - системные побочные эффекты ГКС.

При *применении на коже лица* - возможны телеангиоэктазии, атрофия подкожной клетчатки в области рта.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (при применении на обширных очагах поражения).

Условия хранения:

Список Б. В недоступном для детей месте, при температуре не выше 15°C.

Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gioksizon>